

# OPILIÕES DA COLEÇÃO DO MUSEU NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. (\*)

por  
B. M. SOARES

## INTRODUÇÃO

Conforme havia prometido em trabalho anterior (Cf. SOARES, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 163), dou agora a lista dos opiliões da coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não se trata de revisão, mas apenas de enumeração das espécies, com as respectivas procedências e nomes atualizados, excluindo as formas estranhas à região neotrópica. Aliás, o material foi determinado exclusivamente por notável especialista, o PROF. CÂNDIDO DE MELLO-LEITÃO, cujos tipos, em sua quase totalidade, se acham aí depositados. Conversando com êste eminente zoólogo a respeito dos tipos de aracnídeos do Museu Nacional, fui informado de que no momento não possui mais coleção particular, tendo todos os tipos de sua coleção sido incorporados à desse Museu.

Eis a lista das espécies de opiliões dessa preciosíssima coleção:

### Subordem LANIATORES

#### A. Família COSMETIDAE

##### I. Subfamília COSMETINAE

1. ***Acantholibitia pustulosa*** Mello-Leitão.

*Acantholibitia pustulosa* Mello-Leitão, 1928, Bol. Mus. Nac., 4 (2): 10, fig. 2.  
N.º 1.379. 5 exemplares. Tipos. Pinheiro (Rio de Janeiro). E. DE MORAIS  
MELLO col.

A procedência indicada na diagnose original é outra:  
Campo Grande (Mato Grosso).

---

(\*) Recebido para publicação em 18-IV-1944.

2. **Cosmetus variolosus** Mello-Leitão.  
*Cosmetus variolosus* Mello-Leitão, 1942, Bol. Mus. Nac., 14-17 (1938-1941): 4, fig. 2.  
 N.º 58.201. 1 exemplar. Goitacazes (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.  
 O número do tipo, indicado na diagnose da espécie, é 55.089.
3. **Cynorta clavipus** Roewer.  
*Cynorta clavipus* Roewer, 1928, Abh. Nat. Ver. Brem., 26 (3): 561.  
 N.º 1.371. Macho. Colômbia.
4. **Cynorta geayi** Roewer.  
*Cynorta geayi* Roewer, 1912, Arch. Naturg., 78 A (10): 34, pr. 2, fig. 13.  
 N.º 1.370. 1 fêmea. Loja (Ecuador).
5. **Cynorta guttulosa** Mello-Leitão.  
*Cynorta guttulosa* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 375, fig. 6.  
 N.º 42.473. 1 fêmea. Nova Roma (Goiaz).  
 Deve ser o cótipo referido na diagnose original, pois os números conferem. A procedência, porém, indicada na descrição da espécie, é Barro Alto (Minas Gerais).
6. **Cynorta mayi** Mello-Leitão.  
*Cynorta mayi* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 116, fig. 2.  
 N.º 1.368. 4 exemplares. Tipos. Pará. E. MAY col.
7. **Cynorta refracta** Mello-Leitão.  
*Cynorta refracta* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4): 303, fig. 6.  
 N.º 289. 2 exemplares. Tipos. Cúcuta (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.  
 A localidade-tipo, indicada na diagnose original, é: arredores de Bogotá (Colômbia).
8. **Cynorta simplex** Roewer.  
*Cynorta simplex* Roewer, 1928, Abh. Nat. Ver. Brem., 26 (3): 571, fig. 18.  
 N.º 1.369. 1 fêmea. Colômbia.
9. **Cynortellana pulchra** Mello-Leitão.  
*Cynortellana pulchra* Mello-Leitão, 1928, Bol. Mus. Nac., 4 (2): 9, fig. 1.  
 N.º 1.367. 27 exemplares. Tapera (Pernambuco). FR. BENTO PICKEL col.
10. **Cynortula adspersa** Mello-Leitão.  
*Cynortula adspersa* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 98.  
 N.º 112. 4 exemplares. Tipos. Los Venados — Caracas (Venezuela).
11. **Cynortula juruensis** (Mello-Leitão).  
*Eucynortella juruensis* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 111, fig. 2.  
*Cynortula serriperna* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª parte): 442, fig. 3.



*Cynortula juruensis*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 176 (= *Cynortula serriperma* Mello-Leitão).

N.º 1.372. 1 macho. Rio Janinana. CARVALHO col. Tipo de *Cynortula serriperma* Mello-Leitão, 1932.

12. **Euerginus subserialis** (Cambridge).

*Erginus subserialis* Pick.-Cambridge, 1905, Biol. Centr. Amer. 2 (Arach.): 564, pr. 53, fig. 2 — 2 a, b.

N.º 50.235. 2 exemplares. Acaireto (República de São Salvador).

13. **Eulibitia maculata** Roewer.

*Eulibitia maculata* Roewer, 1912, Arch. Naturg., 78 A (10): 17 pr. 1, fig. 1. N.º 168. Colômbia.

14. **Flirtea caracasensis** Mello-Leitão.

*Flirtea caracasensis* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 98.

N.º 474. 1 exemplar. Tipo. El Valle — Caracas (Venezuela). BERTHIER leg.

15. **Flirtea quinquelineata** (Simon).

*Rhaucus quinquelineatus* Simon, 1879, Ann. Soc. Ent. Belgique, 22: 215.

a) N.º 11.374. 1 exemplar.

b) N.º 202. 5 exemplares.

16. **Gnidia holmbergi** (Soerensen).

*Cosmetus holmbergi* Soerensen, 1884, Naturh. Tidsskr., ser. 3, 14: 590.

N.º 1.373. 1 fêmea. Chaco (Bolívia).

17. **Libitiola borellii** Roewer.

*Libitiola borellii* Roewer, 1925, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, n. s., 40 (34): 8, pr. 5, fig. 6 (Sep.).

N.º 1.374. 1 exemplar. Chaco (Bolívia).

18. **Metavononoides paraguayensis** (Soerensen).

*Cosmetus paraguayensis* Soerensen, 1884, Naturh. Tidsskr., ser. 3, 14: 594.

a) N.º 1.375. 1 exemplar. Mato Grosso.

b) N.º 41.633. 26 exemplares. Rio Grande do Sul. RAMBO col.

c) N.º 56.269. 1 exemplar. Porto Alegre (Rio Grande do Sul). PADRE PIO BUCK col.

19. **Metavononoides barbacenensis** (Mello-Leitão).

*Metavonones barbacenensis* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 109.

N.º 1.378. 3 exemplares. Tipos. Barbacena (Minas Gerais). E. DE MORAIS MELO col.

20. **Metavononoides pustulatus** Mello-Leitão.

*Metavononoides pustulatus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª parte): 62, fig. 28.

N.º 1.377. 3 exemplares. Tipos. Três Corações (Minas Gerais). E. DE MORAIS MELO col.

21. **Metavononoides x-notatus** Mello-Leitão.  
*Metavononoides x-notatus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 30, fig. 25 (Sep.).  
a) N.º 42.532. 1 exemplar. Tipo. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.  
b) N.º 58.034. 2 exemplares. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.
22. **Meterginus flavicinctus** (Gervais).  
*Cosmetus flavicinctus* Gervais, 1842, Mag. Zool. (Arach.): 4, pr. 5 (Sep.).  
N.º 19. 2 exemplares.
23. **Paecilaema tripartitum** Mello-Leitão.  
*Poecilaema tripartitum* Mello-Leitão, 1942, Bol. Mus. Nac., 14-17 (1938-1941): 6, fig. 4.  
N.º 58.205. 8 exemplares. Tipos. Goitacazes (Espírito Santo).
- O número dos tipos, na diagnose original, é 58.206.
24. **Paecilaema x-signatum** Mello-Leitão.  
*Poecilaema x-signatum* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4): 304, fig. 7.  
N.º 163. 1 exemplar. Tipo. Cúcuta (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.
- A procedência, indicada na diagnose original, é: arredores de Bogotá (Colômbia).
25. **Pararhauculus sulfureus** Mello-Leitão. (1)  
*Pararhauculus sulfureus* Mello-Leitão, 1939, Rev. Chil. Hist. Nat., año 43 (1939): 171.  
N.º 58.167. 1 macho. Tipo. El Puna (Ecuador). FRANCISCO DE CAMPOS col.
- A procedência, na diagnose original, é: Guayaquil (Ecuador).
26. **Platymessa H-inscripta** Mello-Leitão.  
*Platymessa H-inscripta* Mello-Leitão, 1941, An. Acad. Bras. Cien., 13 (3): 167, fig. 2.  
N.º 282. 1 exemplar. Tipo. Espinal (Colômbia).
27. **Platymessa nigrolimbata** Mello-Leitão.  
*Platymessa nigrolimbata* Mello-Leitão, 1941, An. Acad. Bras. Cien., 13 (3): 168, fig. 3.  
a) N.º 463. 1 exemplar. Tipo. San Gil (Colômbia).  
b) N.º 58. 3 exemplares. La Uvita (Colômbia).
28. **Poecilaemula bella** Mello-Leitão.  
*Poecilaemula bella* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 443, fig. 3.  
a) N.º 1.376. 3 exemplares. Tipos. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).  
b) N.º 54.325. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

---

(1) *Pararhauculus* Mello-Leitão, 1939, é nome que já foi usado por ROEWER, em 1933. (Cf. Mello-Leitão, 1939, Rev. Chil. Hist. Nat., año 43 (1939): 171, e Roewer, 1933, Ann. Nat. Mus. Wien, 46: 291). O Prof. MELLO-LEITÃO deve, pois, dar nome novo a êste seu gênero.



- c) N.º 42.355. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). COUCEIRO col.  
 d) N.º 50.245. 1 exemplar. Alto da Tijuca (Rio de Janeiro).  
 e) N.º 42.223. 4 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

29. **Poecilaemula brasiliensis** (Mello-Leitão).

*Eucynorta brasiliensis* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 111, fig. 3.

*Poecilaemula punctilineata* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 373, fig. 4.

*Poecilaema ornatissimum* Mello-Leitão, 1942, Bol. Mus. Nac., 14-17 (1938-1941): 6, fig. 3.

*Poecilaemula brasiliensis*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos, Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 264 (= *Poecilaemula punctilineata* Mello-Leitão, 1935 = *Poecilaema ornatissimum* Mello-Leitão, 1942).

a) N.º 42.353. 1 exemplar. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col. Determinado como *Poecilaemula punctilineata* Mello-Leitão, 1935.

b) N.º 58.204. 4 exemplares. Colatina (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col. Determinados como *Poecilaema ornatissimum* Mello-Leitão, 1942.

c) N.º 58.203. 5 exemplares. Goitacazes (Espírito Santo). Determinados como *Poecilaema ornatissimum* Mello-Leitão, 1942.

Nenhum dos dois números (58.203 e 58.204) coincide com o dos tipos de *Poecilaema ornatissimum* Mello-Leitão, 1942, como está indicado na diagnose original desta suposta espécie (55.092).

30. **Poecilaemula luteopunctata** Mello-Leitão.

*Poecilaemula luteopunctata* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 93.

N.º 53.925. 1 exemplar. Sai (Rio de Janeiro). COUCEIRO col.

E' provável que se trate do tipo, se bem que a procedência e o colecionador, indicados na diagnose original, sejam outros: Pinheiro (Rio de Janeiro), E. DE MORAIS MELO col.

## II. Subfamília DISCOSOMATICINAE

31. **Bodunius biocellatus** Mello-Leitão.

*Bodunius biocellatus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 376, fig. 7.

N.º 42.363. 1 exemplar. Cótipo. Minas Gerais.

O habitat, na diagnose original, está mais detalhado: Barro Alto (Minas Gerais).

32. **Gryne coccinelloides** (Mello-Leitão).

*Poecilaema coccinelloides* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 374, fig. 5.

N.º 42.474. 1 exemplar. Cótipo. Nova Roma (Goiaz).

A procedência não está de acôrdo com a indicada no final da descrição da espécie, e que é: Barro Alto (Minas Gerais).

33. **Gryne dimorpha** Mello-Leitão.  
*Gryne dimorpha* Mello-Leitão, 1928, Bol. Mus. Nac., 4 (2) : 10, fig. 3.  
 N.º 1.382. 22 exemplares. Tipos. Campo Grande (Mato Grosso).
34. **Gryne oreensis** (Soerensen).  
*Cosmetus oreensis* Soerensen, 1879, Naturh. Tidsskr., 12: 217.  
 a) N.º 1.381. 5 exemplares. Santa Fé (Argentina).  
 b) N.º 1.380. 1 exemplar.
35. **Gryne perlata** Mello-Leitão.  
*Gryne perlata* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4) : 19, fig. 15 (Sep.).  
 N.º 41.773. 4 exemplares. Tipos. Pernambuco. E. H. CORDEIRO col.
- O habitat indicado na diagnose original é Paraíba do Norte e não Pernambuco.
36. **Gryne pluriarcuata** Mello-Leitão.  
*Gryne pluriarcuata* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4) : 18, fig. 14 (Sep.).  
 N.º 42.530. 2 exemplares. Tipos. Tapera (Pernambuco). D. BENTO PICKEL col.
37. **Roquettea singularis** Mello-Leitão.  
*Roquettea singularis* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2) : 117, fig. 3, 4.  
 N.º 1.383. 1 exemplar. Tipo Pará. E. MAY col.

## B. Família GONYLEPTIDAE

### I. Subfamília BOURGUYINAE

38. **Bourguyia albiornata** Mello-Leitão.  
*Bourguyia albiornata* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 128, fig. 10;  
 Soares, 1943, Boletim de Indústria Animal, São Paulo, n. s., 6 (3) : 9 (= *Bourguyia curvipes* Mello-Leitão, 1923 = *Afranius amarali* Mello-Leitão, 1934 = *Isopucroliia conspersa* Mello-Leitão, 1937 = *Afranius tuberiproctus* (Piza, 1938));  
 Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17) : 272 (= *Isopucroliia tripos* Mello-Leitão, 1937); Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15) : 169 (= *Isopucroliia uniformis* Mello-Leitão, 1927).  
*Bourguyia curvipes* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 129, fig. 11.  
*Isopucroliia uniformis* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2) : 14.  
*Afranius amarali* Mello-Leitão, 1934, Mem. Inst. But., 8 (1933-1934) : 409, fig. 1.  
*Isopucroliia tripos* Mello-Leitão, 1937, Mem. Inst. But., 11 : 276, fig. 1.  
*Isopucroliia conspersa* Mello-Leitão, 1937, Mem. Inst. But., 11 : 277, fig. 2.  
*Osasco tuberiproctus* Piza, 1938, Folia Clinica et Biologica, 10 (4) : 113, fig. 1.  
 a) N.º 1.392. 1 exemplar. São Paulo. Tipo de *Isopucroliia uniformis* Mello-Leitão, 1927.  
 b) N.º 53.928. 2 exemplares. Campinas. CAMARGO col. Determinados como *Isopucroliia uniformis* Mello-Leitão, 1927.



39. **Camarana minor** Mello-Leitão.

*Camarana minor* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 378, fig. 9.

N.º 42.475. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). COUCEIRO col.

40. **Despiroides pulcher** Mello-Leitão.

*Despiroides pulcher* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 226.

N.º 1.527. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro).

A procedência indicada na diagnose original é muito diferente: Pará, coligido por E. MAY.

41. **Despiroides rosai** (Mello-Leitão).

*Neoborghyia rosai* Mello-Leitão, 1940, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 1: 40.

N.º 139. 2 exemplares. Tipos. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). MÁRIO ROSA col.

42. **Despiroides xanthophthalmus** Mello-Leitão.

*Despiroides xanthophthalmus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª parte): 225.

N.º 42.225. 2 exemplares. Tipos. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

43. **Discocyrtoides minutus** (Mello-Leitão).

*Ibarroides minutus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 223.

*Discocyrtoides granulatus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 40, fig. 35 (Sep.).

*Discocyrtoides minutus*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 167 (= *Discocyrtoides granulatus* Mello-Leitão, 1936).

a) Macho e fêmea. Terezópolis (Rio de Janeiro). ALÍPIO DE MIRANDA RIBEIRO col. Exemplares secos (de exposição). Tipos de *Ibarroides minutus* Mello-Leitão, 1932.

b) N.º 42.232. 1 macho. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). COUCEIRO col. Tipo de *Discocyrtoides granulatus* Mello-Leitão, 1936.

44. **Discocyrtoides montanus** (Mello-Leitão).

*Despirus montanus* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4): 439.

N.º 400. 2 exemplares. Tipo e parátipo. Serra do Cipó (Minas Gerais). MARTINS leg.

45. **Discocyrtoides nigricans** (Mello-Leitão).

*Ancistrotus nigricans* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 344.

*Mitobatoides nigricans*, in Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 22.

*Discocyrtoides violaceus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 131, fig. 13; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3: 224 (= *Discocyrtoides ypirangae* Mello-Leitão, 1923 = *Despirus ustus* Mello-Leitão, 1937 = *Despirus piracicabensis* Piza, 1938).

*Discocyrtoides ypirangae* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 132.

*Despirus ustus* Mello-Leitão, 1937, Mem. Inst. But., 11: 287, fig. 9.

*Despirus piracicabensis* Piza, 1938, Folia Clinica et Biologica, São Paulo, 10 (4): 121, fig. 7.

- Discocyrtoides nigricans*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 249.  
N.º 242. 1 exemplar. Ipiranga (Estado de São Paulo — São Paulo). F. LANGE DE MORRETES col. Determinado como *Despirus ustus* Mello-Leitão, 1937.
46. **Discocyrtoides parvulus** (Roewer).  
*Discocyrtus parvulus* Roewer, 1927, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges., 40: 337, fig. 3.  
a) N.º 42.253. 2 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.  
b) N.º 42.689. 1 exemplar. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
47. **Discocyrtoides vellutinus** (Mello-Leitão).  
*Ruschia vellutina* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 106.  
N.º 201. 1 exemplar. Tipo. Santa Teresa (Espírito Santo). AUGUSTO RUSCHI col.
48. **Discocyrtoides zonatus** (Mello-Leitão).  
*Despirus zonatus* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 29, fig. 22.  
N.º 41.807. 2 exemplares. Tipos. Ribeira do Iguape. OTON LEONARDOS col.

## II. Subfamília CAELOPYGINAE

49. **Ampheres asper** (Perty).  
*Gonyleptes asper* Perty, 1832, Delect. An. Artic., pag. 202, n.º 7.  
N.º 1.452. 1 exemplar. Terezópolis (Rio de Janeiro). PAULO MIRANDA RIBEIRO col.
50. **Caelopygus macrocanthus** C. L. Koch.  
*Caelopygus macrocanthus* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 81, fig. 574.  
N.º 1.450. 2 exemplares. Terezópolis (Rio de Janeiro). PAULO MIRANDA RIBEIRO col.
51. **Exochobunus pulcherrimus** Mello-Leitão.  
*Exochobunus pulcherrimus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 139, fig. 10.  
N.º 11.396. 1 fêmea. Tipo. Alto da Serra (Estado de S. Paulo). R. SPITZ col.
52. **Garatiba bisignata** Mello-Leitão.  
*Garatiba bisignata* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 104.  
N.º 182. 5 exemplares. Tipos. Mangaritiba (Rio de Janeiro). BERLA col.
53. **Heterampheres variabilis** Mello-Leitão.  
*Heterampheres variabilis* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 408, fig. 29, 30.  
N.º 42.462. 3 exemplares. Tipos. Morro de Caxambu — Petrópolis (Rio de Janeiro).
54. **Heterarthrodes alvimi** Mello-Leitão.  
*Heterarthrodes alvimi* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 406, fig. 28.  
N.º 42.465. Tipos. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

Não há, no rótulo dos tipos, referência a Morro de Caxambu, como se lê na descrição da espécie.



55. **Iguapeia melanocephala** Mello-Leitão.  
*Iguapeia melanocephala* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 23, fig. 16.  
 a) N.º 41.809. 2 exemplares. Tipos. Ribeira do Iguape. OTON LEONARDOS col.  
 b) N.º 42.206. 1 exemplar. Paraná. OTON LEONARDOS col.
56. **Liarthodes granulatus** Mello-Leitão.  
*Liarthodes granulatus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 357. N.º 1.449. 2 exemplares. Tipos. Petrópolis (Rio de Janeiro). MÁRIO ROSA col.
57. **Metarthodes albimaculatus** Roewer.  
*Metarthodes albimaculatus* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 329, fig. 131. N.º 42.465. 3 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
58. **Metarthodes melanacanthus** Roewer.  
*Metarthodes melanacanthus* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79A (4): 325, fig. 129. N.º 41.935. 1 exemplar. Copacabana (Rio de Janeiro). Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 174.
59. **Metarthodes triangularis** Roewer.  
*Metarthodes triangularis* Roewer, 1931, Abh. Nat. Ver. Brem., 28 (2-3): 132, fig. 12. N.º 42.463. 2 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
60. **Parampheres nigrimanus** Mello-Leitão.  
*Parampheres nigrimanus* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 147, fig. 17. N.º 28.144. 1 exemplar. Tipo. Rio Grande do Sul. P. BALDUINO RAMBO col.
61. **Parampheres pectinatus** Roewer.  
*Parampheres pectinatus* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 345, fig. 136. N.º 41.951. 1 exemplar. Itapiranga. PE. PRO BUCK col.
62. **Pristocnemis pustulatus** C. L. Koch.  
*Pristocnemis pustulatus* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 16, fig. 547.  
 a) N.º 1.447. 3 exemplares.  
 b) N.º 1.448. 1 exemplar. Itatiáia. MOREIRA col. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 174.  
 c) s/n. 1 exemplar. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
63. **Zalonius punctatus** Mello-Leitão.  
*Zalonius punctatus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 28, fig. 24 (Sep.). N.º 42.688. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

### III. Subfamília CRANAINAE

64. **Allocranaus giganteus** Mello-Leitão.  
*Allocranaus giganteus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4): 307, fig. 8. N.º 126. 2 exemplares. Tipos. Cúcuta (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.

Na diagnose original não há referência a Cúcuta, lendo-se

ai, quanto à procedência, o seguinte: arredores de Bogotá, Colômbia.

65. **Cucutacola nigra** Mello-Leitão.  
*Cucutacola nigra* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4) : 308, fig. 9.  
N.º 445. 1 exemplar. Tipo. Cúcuta (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.
66. **Guayaquiliana camposi** Mello-Leitão.  
*Guayaquiliana camposi* Mello-Leitão, 1935, An. Acad. Bras. Cien., 7 (1) : 2, fig. 2.  
N.º 42.203. 2 exemplares. Tipos. Guayaquil (Ecuador). FRANCISCO DE CAMPOS col.
67. **Oranellius brasiliensis** Mello-Leitão.  
*Oranellius brasiliensis* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4) : 441.  
N.º 473. 2 exemplares. Tipos. Aruá (Pará). LEITÃO DE CARVALHO col.
68. **Rhopalocranaus crulsi** Mello-Leitão.  
*Rhopalocranaus crulsi* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.) :  
119, fig. 52 a.  
N.º 1.445. 2 exemplares. Tipos. Rio Cuminá (Amazonas).
69. **Rhopalocranoïdes annulatus** Mello-Leitão.  
*Rhopalocranoïdes annulatus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 118.  
N.º 11.388. 1 macho. Tipo. Pará. E. MAY col.

#### IV. Subfamília GONIOSOMINAE

70. **Acutisoma acutangulum** (Simon).  
*Goniosoma acutangulum* Simon, 1879, Ann. Soc. Ent. Belgique, 22: 230.  
N.º 42.427. 5 exemplares. Angra dos Reis (Rio de Janeiro). J. LIMA col.
71. **Acutisoma cruciferum** (Mello-Leitão).  
*Progoniosoma cruciferum* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 155.  
a) N.º 1.453. 1 exemplar. Tipo. Corcovado (Rio de Janeiro). E. DE MORAIS  
MELO col.  
b) N.º 18.199. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.
72. **Acutisoma hamatum** (Roewer).  
*Itatiaya hamata* Roewer, 1928, Ann. Bull. Soc. Ent. Belgique, 68: 125.  
*Leitaoius hamatus*, in Roewer, 1929, Abh. Nat. Ver. Brem., 27 (3) : 443.  
N.º 41.522. Itatiáia. F. MACHADO col.
73. **Acutisoma indistinctum** (Mello-Leitão).  
*Mitogoniella indistincta* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4) :  
35, fig. 31 (Sep.).  
a) N.º 42.563. 2 exemplares. Tipos. Santa Bárbara (Minas Gerais). LUCIANO  
DE MORAIS col.  
b) N.º 42.564. 3 exemplares. Santa Bárbara (Minas Gerais). LUCIANO DE  
MORAIS col.  
c) N.º 1.570. Santa Bárbara (Minas Gerais). LUCIANO DE MORAIS col.



74. **Acutisoma inerme** Mello-Leitão.  
*Acutisoma inerme* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 416.  
 N.º 1.454. 1 exemplar. Tipo. Blumenau (Santa Catarina).
75. **Acutisoma molle** (Mello-Leitão).  
*Pygosomoides mollis* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 140, fig. 6.  
*Leitaoius guttulatus* Mello-Leitão, 1934, Mem. Inst. But., 8 (1933-1934): 413, fig. 4.  
*Acutisoma molle*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 263 (= *Leitaoius guttulatus* Mello-Leitão, 1934).  
 N.º 27.609. 1 exemplar. Tipo. Curitiba (Paraná). FR. Z. ROHR col.
76. **Acutisoma monticolum** Mello-Leitão.  
*Acutisoma monticola* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 342.  
*Leitaoius xanthomus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 404, fig. 27.  
*Mitogoniella mutila* Piza, 1938, Bol. Biol., n. s., 3 (3-4): 140, Est. 4, fig. G.  
*Leitaoius nitidissimus* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. S. Paulo, 1: 24, fig. 26.  
*Acutisoma monticolum*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 262 (= *Leitaoius xanthomus* Mello-Leitão, 1935 = *Leitaoius nitidissimus* Mello-Leitão, 1940); Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (20): 221 (= *Mitogoniella mutila* Piza, 1938).  
 N.º 42.330. 1 exemplar. Cantareira (São Paulo). L. TRAVASSOS FILHO col.  
 Tipo de *Leitaoius xanthomus* Mello-Leitão, 1935.
77. **Acutisoma perditum** (Mello-Leitão).  
*Glyptogoniosoma perditum* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 36, fig. 32 (Sep.).  
 N.º 42.705. 1 exemplar. Tipo. Paraopeba (Minas Gerais). VITAL DE SOUZA col.
78. **Acutisoma proximum** Mello-Leitão.  
*Acutisoma proximum* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 343; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 262 (= *Leitaoius ornatus* Mello-Leitão, 1934).  
*Leitaoius ornatus* Mello-Leitão, 1934, Mem. Inst. But., 8: 412, fig. 3.  
 N.º 41.738. 1 exemplar. São Paulo. Determinado como *Leitaoius ornatus* Mello-Leitão, 1934.
79. **Cadeadoius pungens** Mello-Leitão.  
*Cadeadoius pungens* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 16, fig. 12 (Sep.).  
 N.º 42.272. Tipo. Paraná. F. LANGE col.
- Na diagnose original, a procedência indicada é: Cadeado (Paraná).
80. **Goniosoma geniculatum** Mello-Leitão.  
*Goniosoma geniculatum* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 125, fig. 15 a.  
 N.º 18.207. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.
81. **Goniosoma obscurum** Perty.  
*Goniosoma obscurum* Perty, 1832, Delect. An. Artic., p. 202.  
 N.º 58.216. 2 exemplares. Goitacazes (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

82. **Goniosoma vatrax** C. L. Koch.  
*Goniosoma vatrax* C. L. Koch, 1848, Arach., 12: 21, fig. 970.  
N.º 1.492. 1 exemplar. Ouro Preto (Minas Gerais).
83. **Goniosoma xanthophthalmum** Mello-Leitão.  
*Goniosoma xanthophthalmum* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 125, fig. 4; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 178 (= *Acutisomella cryptoleuca* Mello-Leitão, 1940).  
*Acutisomella cryptoleuca* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 26, fig. 27.  
a) N.º 11.382. 3 exemplares. Tipos. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.  
b) N.º 58.400. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col. Tipo de *Acutisomella cryptoleuca* Mello-Leitão, 1940.  
c) N.º 42.224. 4 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.
84. **Goniosomella perlata** Mello-Leitão.  
*Goniosomella perlata* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 33, fig. 29 (Sep.).  
N.º 42.562. 1 exemplar. Tipo. Santa Bárbara (Minas Gerais). LUCIANO DE MORAIS col.
85. **Goniosomoides viridans** Mello-Leitão.  
*Goniosomoides viridans* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte): 461.  
1 macho. Tipo. Terezópolis (Rio de Janeiro). A. MIRANDA RIBEIRO col. Material sêco (de exposição).
86. **Progoniosoma badium** (C. L. Koch).  
*Goniosoma badium* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 65, fig. 568.  
N.º 1.455. 1 exemplar. Blumenau (Santa Catarina). Cf. Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 402.
87. **Progoniosoma calcar** Roewer.  
*Progoniosoma calcar* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 272, fig. 109.  
a) N.º 42.000. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.  
b) N.º 42.329. Angra dos Reis (Rio de Janeiro). TRAVASSOS col.
88. **Progoniosoma minense** Mello-Leitão.  
*Progoniosoma minense* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª parte): 265, fig. 140.  
N.º 1.490. 1 exemplar. Tipo. Ouro Preto (Minas Gerais).
89. **Spelaeosoma spelaeum** Mello-Leitão.  
*Spelaeosoma spelaeum* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 139, fig. 5.  
N.º 27.173. 1 exemplar. Tipo. Gruta do Iporanga (São Paulo). LEONARDOS col.
90. **Xulapona cara** Mello-Leitão.  
*Xulapona cara* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 32, fig. 27, 28 (Sep.).  
a) N.º 42.531. 2 exemplares. Tipos. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.  
b) N.º 42.531. 6 exemplares. Viçosa. (Minas Gerais), J. MOOJEN col.  
c) N.º 42.531. 2 exemplares. Viçosa. (Minas Gerais), J. MOOJEN col.  
d) s/n. 4 exemplares.



V. Subfamília *GONYLEPTINAE*91. **Acrogonyleptoides exochus** Mello-Leitão.

*Acrogonyleptoides exochus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33:134, fig. 7. N.º 11.391. Tipo.

A procedência não está indicada no rótulo, mas, na diagnose original, se lê o seguinte: Rio Negro (Paraná), FR. BORGMEIER leg.

92. **Adelphobunus pulcher** Mello-Leitão.

*Adelphobunus pulcher* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 393, fig. 20. N.º 42.362. Tipo. Pôrto Ricardo (Mato Grosso).

Na descrição da espécie está indicado que o material foi coligido por WORONTZOW.

93. **Arleius incisus** Mello-Leitão.

*Arleius incisus* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 22, fig. 15.

a) N.º 41.759. Tipo. Gávea (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

b) N.º 41.791. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

94. **Bunoleptes armatus** Mello-Leitão.

*Bunoleptes armatus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 398, fig. 23.

N.º 42.477. 1 macho. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). J. COUCEIRO col.

95. **Caxambusia variegata** Mello-Leitão.

*Caxambusia variegata* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 395, fig. 21.

N.º 41.997. 1 macho. Tipo. Morro de Caxambu, Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

96. **Cryptomeloleptes spinosus** Mello-Leitão.

*Cryptomeloleptes spinosus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 138, fig. 9.

N.º 11.392. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

97. **Crypturocytia crypturocytia** Mello-Leitão.

*Crypturocytia crypturocytia* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 236.

a) 1 macho. Tipo. Itatiáia. Material sêco (de exposição).

b) N.º 18.202. 1 macho. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col. Cf. Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 123.

c) N.º 53.928. Itatiáia. BASTOS col.

98. **Friburgoia impar** Mello-Leitão.

*Friburgoia impar* Mello-Leitão, 1932, Bol. Mus. Nac., 8: 72.

N.º 16.134. 1 fêmea. Tipo. Friburgo (Rio de Janeiro).

O número indicado na diagnose original é 14.134.

99. **Geraecormobius absconsus** (Mello-Leitão).

*Weyhia absconsa* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 284, fig. 175.

N.º 1.501. 1 exemplar. Tipo. Rio de Janeiro.

Na diagnose original a procedência indicada é: Niterói (Rio de Janeiro).

100. **Geraecormobius anomalus** (Mello-Leitão).

*Weyhia anomala* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33:126.

N.º 11.378. 4 fêmeas. Tipos.

A procedência indicada na descrição da espécie é: Rio Negro (Paraná), FR. BORGMEIER leg.

101. **Geraecormobius armatus** (Roewer).

*Weyhia armata* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 191, fig. 79.

a) N.º 1.548. 9 exemplares. Cachoeirinha (Paraná).

b) N.º 26.917. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE col.

c) N.º 41.948. Itapiranga. PE. PRO BUCK col.

d) N.º 1.516. Itatiáia. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24:137.

102. **Geraecormobius bisignatus** (Mello-Leitão).

*Weyhia bisignata* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 141, fig. 7.

N.º 27.321. 8 exemplares. Tipos. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col.

103. **Geraecormobius cheloides** Mello-Leitão.

*Geraecormobius cheloides* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 19, fig. 23.

a) N.º 58.236. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

b) N.º 119. 3 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

c) N.º 172. 8 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

É provável que o espécime número 58.236 seja o tipo (número 58.239 da diagnose original).

104. **Geraecormobius clavifemur** (Mello-Leitão).

*Weyhia clavifemur* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 416.

N.º 1.496. 1 exemplar. Tipo. Blumenau (Santa Catarina).

105. **Geraecormobius convexus** (Mello-Leitão). (1)

*Geraecormobiella convexa* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 128.

N.º 18.203. 6 exemplares. Tipos. Rio de Janeiro. BERLA col.

A procedência indicada na diagnose original é Itatiáia, DA. RISOLETA DA SILVA col. Parece-me que *Geraecormobius absconsus* (Mello-Leitão, 1932) é sinônimo desta espécie.

---

(1) A espécie foi descrita originalmente no gênero *Geraecormobiella* Mello-Leitão, 1931 (Cf. Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 127), que é, evidentemente, sinônimo de *Geraecormobius* Holmberg.



**106. *Geraecormobius curvicornis* (Roewer).**

*Weyhia curvicornis* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 193, fig. 80.

a) N.º 1.504. 2 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro).

b) N.º 1.500. 2 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro).

c) N.º 137. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

**107. *Geraecormobius montis* (Mello-Leitão).**

*Weyhia montis* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 386, fig. 15.

N.º 42.461. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

Na diagnose original a procedência está mais especificada:  
Independência, Petrópolis (Rio de Janeiro).

**108. *Geraecormobius nanus* (Mello-Leitão).**

*Weyhia nana* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 388, fig. 16.

a) N.º 42.354. 1 exemplar. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

b) N.º 42.696. 1 exemplar. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

O tipo, parece-me, é o espécime número 42.354, indicado na diagnose original sob o número 42.554.

**109. *Geraecormobius parvus* (Roewer).**

*Weyhia parva* Roewer, 1916, Arch. Naturg., 82 A (2): 133, fig. 30.

a) N.º 42.697. Andaraí, Niterói (Rio de Janeiro). MÁRIO ROSA col.

b) N.º 42.226. 4 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

**110. *Geraecormobius rohri* (Mello-Leitão).**

*Weyhia rohri* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 142, fig. 8; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 272 (= *Weyhia serriperina* Mello-Leitão, 1937).

*Weyhia serriperina* Mello-Leitão, 1937, Mem. Inst. But., 11: 284, fig. 6.

N.º 27.610. Tipo. Curitiba (Paraná). FR. Z. ROHR col.

**111. *Geraecormobius silvarum* Holmberg.**

*Geraecormobius silvarum* Holmberg, 1888, (?), Bol. Ac. Argentin., 10: 211.

N.º 154. 2 exemplares. Loreto, Misiones (Argentina).

**112. *Giltaya solitaria* Mello-Leitão.**

*Giltaya solitaria* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 467.

a) N.º 1.473. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col. Na diagnose original não está especificada a localidade-tipo de Jacarepaguá.

b) N.º 1.483. 1 exemplar. Niterói (Rio de Janeiro). No rótulo deste espécime estava escrito o nome *Weyhia vellardi*; aliás, nunca foi descrita nenhuma espécie com este nome em *Geraecormobius* Holmberg (= *Weyhia*).

**113. *Gonyleptes acanthopus* (Quoy et Gaimard).**

*Phalangium acanthopus* Quoy et Gaimard, 1824, Voyage de l'Uranie, Zool., pág. 546, pr. 62, figs. 2 (macho), 3 (fêmea).

a) N.º 1.488. 6 exemplares. Itatiaia.

b) N.º 42.349. 1 macho. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). J. COUCEIRO col.

**114. *Gonyleptes atrus* Mello-Leitão.**

*Gonyleptes atrus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 140, fig. 16.

*Gonyleptes niger* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.), fig. 167.

a) N.º 1.462. 1 exemplar. Monte Serrat.

b) N.º 1.497. 10 exemplares. Itatiáia.

c) N.º 1.460. 2 exemplares. Tijuca (Rio de Janeiro).

O espécime número 1.462, de Monte Serrat, traz a indicação de tipo. É da mesma espécie dos tipos do Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, com que tive ensejo de compará-lo.

Os dois espécimes, número 1.460, estavam determinados como *Gonyleptes niger* (tipos). Mas não passam de exemplares de *Gonyleptes atrus* Mello-Leitão, 1923, de tonalidade um pouco mais escura. Aliás, *Gonyleptes niger* nunca foi descrito, apenas há uma figura desta suposta espécie, sem a respectiva descrição (Cf. Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.), fig. 167).

**115. *Gonyleptes barbiellinii* Mello-Leitão.**

*Gonyleptes barbiellinii* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 298, fig. 155.

N.º 1.459. 1 exemplar. Tipo. São Sebastião (São Paulo).

**116. *Gonyleptes brieni* (Giltay).**

*Weyhia brieni* Giltay, 1928, Ann. Bull. Soc. Ent. Belgique, 68: 83, fig. 1.

a) N.º 56.450. Campos de Jordão (São Paulo). F. LANE col.

b) N.º 11.381. 1 exemplar. Guapira (São Paulo). OLEGÁRIO DE OLIVEIRA col. Cf. Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33:133.

c) N.º 18.201. 1 exemplar. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col. Cf. Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33:133.

d) N.º 472. 2 exemplares. Campos de Jordão (São Paulo).

**117. *Gonyleptes cervus* Roewer.**

*Gonyleptes cervus* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 238, fig. 99.

a) N.º 1.464. 1 exemplar. Silvestre. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 141. Não foram encontrados no Museu Nacional os exemplares de *Gonyleptes cervus* Roewer, 1913, de Realengo e Itatiáia, referidos neste trabalho de MELLO-LEITÃO.

b) N.º 55.090. 2 machos e 1 fêmea. Colatina (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

**118. *Gonyleptes eneodon* Mello-Leitão.**

*Gonyleptes eneodon* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 133, fig. 6.

N.º 11.379. 2 exemplares. Tipos. Pinheiro (Rio de Janeiro).

**119. *Gonyleptes horridus* Kirby.**

*Gonyleptes horridus* Kirby, 1818, Tr. Linn. Soc. London, 12: 452 (macho), pr. 22, fig. 16; Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 142; Soares, 1944, Papéis



Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 173 (= *Gonyleptes lacrimosus* Mello-Leitão, 1932).

*Gonyleptes lacrimosus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> parte.): 294, fig. 148.

a) N.º 18.204. 3 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

b) N.º 1.487. Realengo (Rio de Janeiro).

c) N.º 1.505 (ou 11.380). 3 exemplares. Rio de Janeiro.

d) N.º 11.389. 2 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

e) N.º 1.467. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

f) N.º 41.398. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

g) N.º 155. 4 exemplares. Rio de Janeiro.

h) N.º 1.463. 3 exemplares. Rio de Janeiro. Tipos de *Gonyleptes lacrimosus* Mello-Leitão, 1932.

i) N.º 11.789. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col. Determinados como *Gonyleptes lacrimosus* Mello-Leitão, 1932.

120. ***Gonyleptes paucigranulatus* (Mello-Leitão). (1)**

*Gonyleptes paucigranulatus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 143.

N.º 1.457. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro).

121. ***Gonyleptes pectinatus* C. L. Koch.**

*Gonyleptes pectinatus* C. L. Koch, 1845, Arach., 12: 22, fig. 971.

N.º 1.513. 1 exemplar. Itatiáia. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 143.

122. ***Gonyleptes saprophilus* Mello-Leitão.**

*Gonyleptes saprophilus* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 335; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 175 (= *Gonyleptes itatiayae* Mello-Leitão, 1932).

*Gonyleptes itatiayae* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> parte): 300, fig. 157.

a) N.º 1.466. Itatiáia. Cótios.

b) N.º 1.509. 12 exemplares. Itatiáia.

c) N.º 1.472. Itatiáia. Determinados como *Gonyleptes itatiayae* Mello-Leitão, 1932.

d) N.º 1.458. 1 exemplar. Itatiáia. Determinado como *Gonyleptes itatiayae* Mello-Leitão, 1932.

123. ***Gonyleptoides melanostoma* (Mello-Leitão).**

*Moreiranula melanostoma* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 129, fig. 17.

N.º 18.211. 7 exemplares. Tipos. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col.

124. ***Gonyleptoides moreirae* Mello-Leitão.**

*Gonyleptoides moreirae* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 340.

N.º 1.511. Tipo. Itatiáia. CARLOS MOREIRA col.

125. ***Gonyleptoides niger* Mello-Leitão.**

*Gonyleptoides niger* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 21, fig. 14.

N.º 41.811. 2 exemplares. Tipos. Ribeira do Iguape. LEONARDOS col.

(1) Em 1932 foi descrita outra espécie com este mesmo nome, de Itatiáia, e cujo tipo não encontrei no Museu Nacional do Rio de Janeiro (Cf. Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> parte): 293, fig. 146). A espécie de 1932 deve receber nome novo.

126. **Gonypernoides fragilis** Mello-Leitão.  
*Gonypernoides fragilis* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> parte): 465, fig. 14.  
N.º 1.503. Tipo. Itatiaia. ZIKAN col.
127. **Guascaleptes indivisus** Mello-Leitão.  
*Guascaleptes indivisus* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 138, fig. 4.  
N.º 26.918. 1 exemplar. Tipo. Rio Grande do Sul. AMILCAR REGO col.
128. **Holoversia nigra** Mello-Leitão.  
*Holoversia nigra* Mello-Leitão, 1940, Papéis Avulsos Dep. Zool., S. Paulo, 1: 41.  
N.º 238. 2 exemplares. Tipos. Serra do Cipó (Minas Gerais).
129. **Ilhaia cuspidata** Roewer.  
*Ilhaia cuspidata* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 221, fig. 92; Soares, 1943, Boletim de Indústria Animal, São Paulo, n. s., 6 (3): 55 (= *Ilhaia fluminensis* Mello-Leitão, 1922); Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 171 (= *Eduardoius granulatus* Mello-Leitão, 1931).  
*Ilhaia fluminensis* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 334.  
*Eduardoius granulatus* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 95.  
a) N.º 11.383. 1 exemplar. Pinheiro (Rio de Janeiro). Determinado como *Ilhaia cuspidata* Roewer, 1913.  
b) N.º 1.479. Pinheiro (Rio de Janeiro). Tipo de *Ilhaia granulosa* (Mello-Leitão 1931).
130. **Ilhaia fidelis** (Mello-Leitão).  
*Eduardoius fidelis* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 95.  
N.º 1.408. 2 exemplares. Pinheiro (Rio de Janeiro).
131. **Ilhaia intermedia** Mello-Leitão.  
*Ilhaia intermedia* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 401, fig. 25; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 175 (= *Penygorna infusca* Mello-Leitão, 1936).  
*Penygorna infusca* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 31, fig. 26 (Sep.).  
a) N.º 58.037. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.  
b) N.º 42.367. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.  
c) N.º 1.564. 1 exemplar.
- Todos estes espécimes, de a) a c) estavam determinados como *Ilhaia intermedia* Mello-Leitão, 1935.
- d) N.º 42.695. 1 macho e 2 fêmeas. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.  
    Tipos de *Penygorna infusca* Mello-Leitão, 1936.
132. **Ilhaia meridionalis** Mello-Leitão.  
*Ilhaia meridionalis* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 417.  
N.º 1.474. 1 exemplar. Tipo. Blumenau (Santa Catarina).



133. **Jupuvura virescens** Mello-Leitão.  
*Jupuvura virescens* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 16, fig. 19.  
1 exemplar. Tipo.
134. **Liogonyleptoides inermis** (Mello-Leitão).  
*Progonyleptoides inermis* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 334.  
*Progonyleptoides cimex* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 136.  
*Anomaloleptes singularis* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 17, fig. 9.  
*Liogonyleptoides calcaratus* Piza, 1936, Folia Clinica et Biologica, São Paulo, ano 8 (2): 51, fig. 1, 2.  
*Liogonyleptoides inermis*, in Soares, 1943, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3: 193 (= *Liogonyleptoides cimex* (Mello-Leitão, 1923) = *Anomaloleptes singularis* Mello-Leitão, 1935 = *Liogonyleptoides calcaratus* Piza, 1936).  
a) N.º 1.512 (ou 930). 2 exemplares. Amparo (São Paulo).  
b) N.º 41.739. Guaiana (São Paulo).
- Todos os exemplares desta espécie estavam determinados como *Liogonyleptoides cimex* (Mello-Leitão, 1923).
135. **Melloa incerta** (Mello-Leitão).  
*Heterogonyleptes incertus* Mello-Leitão, 1928, Bol. Mus. Nac., 4 (2): 12, fig. 4, 5.  
a) N.º 41.934. Tapera (Pernambuco).  
b) N.º 1.507. Tapera (Pernambuco).  
c) N.º 41.935. Tapera (Pernambuco).  
d) N.º 41.399. Pernambuco. D. BENTO PICKEL col.
136. **Metagoniosoma metropolitanum** Mello-Leitão.  
*Metagoniosoma metropolitanum* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 310, fig. 169.  
N.º 1.498 (ou 931 da coleção MELLO-LEITÃO). 1 exemplar. Tipo. Rio de Janeiro.
137. **Metagonyleptes curvispinosus** (Mello-Leitão).  
*Nygoleptes curvispinosus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 389, fig. 17.  
*Metagonyleptes curvispinosus*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 267.  
N.º 42.480. Cótipo. Lagoa (Santa Catarina).
138. **Metagonyleptes grandis** Roewer.  
*Metagonyleptes grandis* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 210, fig. 87.  
N.º 1.506. Santa Catarina.

E' provável que se trate do material de Joinville (Santa Catarina), a que o PROF. MELLO-LEITÃO se refere (Cf. Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 402).

**139. *Metagonyleptes misandrus* Mello-Leitão.**

*Metagonyleptes misandrus* Mello-Leitão, 1934, Mem. Inst. But., 8:416, fig. 7. N.º 41.740. 1 fêmea. São Paulo.

**140. *Metagonyleptes incertus* (Mello-Leitão).**

*Geraecormobius incertus* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 17, fig. 20.

N.º 184. 1 macho. Tipo. Mangaratiba (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

**141. *Metagonyleptoides anomalus* Mello-Leitão.**

*Metagonyleptoides anomalus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 145; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 172 (= *Gonyleptes tijucanus* Mello-Leitão, 1932 = *Paragonyleptes luteispinis* Mello-Leitão, 1932 = *Kainganga flangei* Mello-Leitão, 1933).

*Gonyleptes tijucanus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 301, fig. 160.

*Paragonyleptes luteispinis* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 463, fig. 15, 16.

*Kainganga flangei* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 144, fig. 9.

a) N.º 1.494. 1 exemplar. Tipo.

A procedência indicada na diagnose original é Tijuca (Rio de Janeiro), MORAIS MELO col.

b) N.º 1.489 (ou 836 da coleção MELLO-LEITÃO). 1 exemplar. Tijuca (Rio de Janeiro). Tipo de *Gonyleptes tijucanus* Mello-Leitão, 1932.

c) N.º 1.493. Jacarepaguá (Rio de Janeiro), BERLA col. Tipos de *Paragonyleptes luteispinis* Mello-Leitão, 1932.

d) N.º 41.398. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col. Determinados como *Paragonyleptes luteispinis* Mello-Leitão, 1932.

e) N.º 26.920. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col. Tipo *Kainganga flangei* Mello-Leitão, 1933.

**\* 142. *Metagonyleptoides bicalcaratus* (Mello-Leitão).**

*Moojenia bicalcarata* Mello-Leitão, 1942, Bol. Mus. Nac., 14-17 (1938-1941): 9, fig. 7.

N.º 58.209. Colatina (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

Na descrição da espécie, o habitat indicado é Colatina e Goitacazes (Espírito Santo), sendo 55.094 o número dos tipos.

**143. *Metagonyleptoides perlatus* (Mello-Leitão).**

*Moojenia perlata* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 384, fig. 13.

a) N.º 42.361. 2 machos. Tipos. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

b) N.º 58.043. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

c) N.º 1.577.

**144. *Monocerodynus variolosus* Mello-Leitão.**

*Monocerodynus variolosus* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 12, fig. 15.

N.º 58.042. Macho e fêmea. Tipos. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.



**145. Neosadocus bufo (Mello-Leitão).**

*Sadocus bufo* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 151, fig. 23.

*Neosadocus bufo*, in Mello-Leitão, 1926, Rev. Mus. Paul., 14: 54 (Sep.); Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 244, 251 (= *Ilhania robusta* Mello-Leitão, 1936=*Polybunus tuberculatus* Piza, 1943).

*Ilhania robusta* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 14, fig. 11 (Sep.).

*Polybunus tuberculatus* Piza, 1943, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3: 45, fig. 4.

N.º 42.289. Antonina (Paraná). F. LANGE col. Tipos de *Ilhania robusta* Mello-Leitão, 1936.

**146. Neosadocus latus (Mello-Leitão).**

*Bunoweyhia lata* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 390, fig. 18.

N.º 42.364. 1 exemplar. Tipo. Lussanvira (Mato Grosso). C. WORONTZOW col.

**147. Neosadocus minor (Mello-Leitão).**

*Bunoweyhia minor* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 19, fig. 12, 12 a.

a) N.º 41.806. 2 exemplares. Tipos. Paranapiacaba (São Paulo). LEONARDOS col.

b) N.º 122. 2 exemplares. Jupuvura. F. LANGE col.

**148. Neosadocus variabilis (Mello-Leitão).**

*Bunoweyhia variabilis* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 18, fig. 10, 10 a.

a) N.º 41.803. Tipo. Ribeira do Iguape. LEONARDOS col.

b) N.º 41.804. Rio Iporanga. LEONARDOS col.

c) N.º 42.207. Paraná. LEONARDOS col.

Na diagnose original, o tipo tem o número 41.805, e não 41.803, como encontrei no respectivo rótulo.

**149. Nictheroya incerta Mello-Leitão.**

*Nictheroya incerta* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 19.

N.º 1.398. Tipo. Niterói (Rio de Janeiro).

**150. Opisthoplites ypsilon Soerensen.**

*Opisthoplites ypsilon* Soerensen, 1884 Naturh. Tidsskr., ser. 3, 14: 615.

N.º 1.470. 1 exemplar. Itatiáia. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 154.

**151. Pachyleptes tetracanthus Mello-Leitão.**

*Pachyleptes tetracanthus* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 459.

N.º 1.495. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

**152. Pachylibunus gomesianus Mello-Leitão.**

*Pachylibunus gomesianus* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 333.

N.º 1.508. 1 exemplar. Tipo. Ouro Preto (Minas Gerais).

Na diagnose original está indicado que o tipo foi coligido por CARLOS DE MAGALHÃES GOMES.

**153. *Paragonyleptes alticola* Mello-Leitão.**

*Paragonyleptes alticola* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 337; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 171 (= *Soerensenia transfasciata* Mello-Leitão, 1931).

*Soerensenia transfasciata* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 132.

*Moreira alticola*, in Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 145.

a) N.º 27.172. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col. Andrótipos de *Paragonyleptes alticola* Mello-Leitão, 1922.

b) N.º 18.206. Determinado como *Paragonyleptes alticola* Mello-Leitão, 1922.

c) N.º 11.385. 1 exemplar. Itatiáia. PADBERG col. Tipo de *Paragonyleptes transfasciatus* (Mello-Leitão, 1931).

**154. *Paragonyleptes auricola* Mello-Leitão.**

*Paragonyleptes auricola* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93: 183, fig. 4.

a) N.º 1.491, Morro Velho (Minas Gerais).

b) N.º 1.515 (ou 840 da coleção MELLO-LEITÃO). 1 exemplar.

Um dêstes dois números deve ser o do tipo.

**155. *Paragonyleptes bicuspidatus* (C. L. Koch).**

*Gonyleptes bicuspidatus* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 39 (fêmea), fig. 556.

a) N.º 1.475. Rio de Janeiro.

b) N.º 1.514. Rio de Janeiro. MORAIS MELO col. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 148.

**156. *Paragonyleptes bimaculatus* (Soerensen).**

*Gonyleptes bimaculatus* Soerensen, 1884, Naturh. Tidsskr., ser. 3, 14: 605 (fêmea).

N.º 1.484. 1 exemplar. Mato Grosso. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 149.

**157. *Paragonyleptes calcaratus* Roewer.**

*Paragonyleptes calcaratus* Roewer, 1930, Abh. Nat. Ver. Brem., 27 (3): 380, fig. 13.

N.º 1.502. 1 exemplar. Terezópolis (Rio de Janeiro). PAULO MIRANDA RIBEIRO col.

**158. *Paragonyleptes curvispina* (Mello-Leitão).**

*Gonyperna curvispina* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 146, fig. 12.

N.º 26.919. Tipo. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.

O número do tipo, indicado na diagnose original, é 26.923.

**159. *Paragonyleptes divaricatus* (Roewer).**

*Gonyperna divaricata* Roewer, 1930, Abh. Nat. Ver. Brem., 27 (3): 437, fig. 40, pr. 7, fig. 8.

N.º 42.285. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

**160. *Paragonyleptes fallax* (Mello-Leitão).**

*Metagonyleptes fallax* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 336, fig. 214.



*Leptogonys marmoratus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 464.  
*Paragonyleptes fallax*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 169 (= *Paragonyleptes marmoratus* (Mello-Leitão, 1932)).

a) N.º 1.517. 1 exemplar. Tipo. Itatiáia.

b) 1 macho. Itatiáia. ZIKAN col. Material seco (de exposição). Tipo de *Paragonyleptes marmoratus*. (Mello-Leitão, 1932).

161. **Paragonyleptes fulvigranulatus** Mello-Leitão.

*Paragonyleptes fulvigranulatus* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 339; Soares, 1943, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3 (11): 195 (= *Paragonyleptes pardalis* (Piza, 1938); Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 253 (= *Paragonyleptes pustulosus* (Mello-Leitão, 1939) = *Diplocaldasius pallidus* Mello-Leitão, 1934); Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 166 (= *Costalimaiella conspicua* Mello-Leitão, 1931).

*Costalimaiella conspicua* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 136, fig. 18.

*Diplocaldasius pallidus* Mello-Leitão, 1934, Mem. Inst. But., 8: 415, fig. 5.

*Kaingangoides pardalis* Piza, 1938, Folia Clinica et Biologia, São Paulo, 10 (4): 120, fig. 6.

*Caldasiella pustulosa* Mello-Leitão, 1939, Bol. Biol., n. s., 4 (3): 350, fig. 6.

*Gonyperna incus* Piza, 1943, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3: 39, fig. 1.

*Paragonyleptes pardalis*, in Piza, 1942, Rev. Brasil. Biol., 2 (4): 410 (= *Gonyperna incus* Piza, 1943).

a) N.º 11.387. 2 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col. Determinados como *Paragonyleptes fulvigranulatus* Mello-Leitão, 1922.

b) N.º 18.210. 1 exemplar. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col. Tipo de *Costalimaiella conspicua* Mello-Leitão, 1931.

162. **Paragonyleptes nigrus** (Mello-Leitão).

*Caldasiella nigra* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 130, fig. 16.

N.º 18.205. 1 fêmea. Tipo. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col.

163. **Paragonyleptes pictus** Piza. (1)

*Caldasiella marmorata* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 144, fig. 10.

*Paragonyleptes pictus* Piza, 1942, Rev. Brasil. Biol., 2 (4): 415 (nom. nov.).

a) N.º 26.921. Macho e fêmea. Tipos. Paraopeba (Minas Gerais). VITAL DE SOUZA col.

b) N.º 42.664. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

(1) O nome *Paragonyleptes pictus* foi criado pelo PROF. PIZA, em 1942, para evitar a homonímia que resultou, com a reunião dos gêneros *Leptogonys* (com *marmoratus* Mello-Leitão, 1932) e *Caldasiella* (com *marmorata* Mello-Leitão, 1933). Assim é que, *Paragonyleptes* Roewer, 1913, ficou com duas espécies com o nome específico *marmoratus*, donde, com toda a razão, a criação de nome novo para a mais recente: *Paragonyleptes marmoratus* (Mello-Leitão, 1932) (= *Leptogonys marmoratus* Mello-Leitão, 1932) e *Paragonyleptes pictus* Piza, 1942 (= *Caldasiella marmorata* Mello-Leitão, 1933). Como, porém, cheguei à conclusão de que *Paragonyleptes marmoratus* (Mello-Leitão, 1932) é sinônimo de *Metagonyleptes fallax* Mello-Leitão, 1932, tendo esta última prioridade de página e tendo sido erradamente colocada em *Metagonyleptes* Roewer, 1913, quando é em verdadeiro *Paragonyleptes* Roewer, 1913 (Cf. Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 169), tornou-se *marmoratus* um sinônimo de *fallax*. Será que desaparece a homonímia entre as duas espécies de *Paragonyleptes* Roewer, 1913, com o nome específico de *marmoratus*? E será que se deve restaurar o nome antigo, *Paragony-*



**164. Paragonyleptes pulcher (Mello-Leitão). (1)**

*Acanthogonyleptes pulcher* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9:336; Soares, 1943, Boletim de Indústria Animal, São Paulo, n. s., 6 (3): 54 (= *Nygoleptes ornatus* Mello-Leitão, 1931).

*Nygoleptes ornatus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 131, fig. 5.

N.º 11.386. 1 macho. Alto da Serra (São Paulo). Tipo de *Nygoleptes ornatus* Mello-Leitão, 1931, em cuja descrição está indicado que foi SPITZ quem o coligiu.

**165. Paragonyleptes pygoplus Roewer.**

*Paragonyleptes pygoplus* Roewer, 1916, Arch. Naturg., 82 A (2): 137, fig. 33.

N.º 42.429. 1 fêmea. Cantareira (São Paulo). L. TRAVASSOS FILHO col.

**166. Pertyana ronae Mello-Leitão.**

*Pertyana ronae* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 18.

N.º 1.385. 3 exemplares. Tipos. Caxias (Rio Grande do Sul).

Na diagnose original está indicado que o material foi coligido por Antonio Rona.

**167. Progonyleptoides pustulosus Mello-Leitão.**

*Progonyleptoides pustulosus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 385, fig. 14.

N.º 42.427. 1 macho. Tipo. Jussaraí, Angra dos Reis (Rio de Janeiro). J. LINS col.

**168. Proweyhia una Mello-Leitão.**

*Proweyhia una* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 414; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 165 (= *Metaxundarava heterotypica* Mello-Leitão, 1927).

*Metaxundarava heterotypica* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 20.

a) N.º 1.468. Macho e fêmea. Tipos. Blumenau (Santa Catarina).

b) N.º 1.477. 3 exemplares. Santa Catarina. Tipos de *Metaxundarava heterotypica* Mello-Leitão, 1927.

**169. Sadocus catharinensis Mello-Leitão.**

*Sadocus catharinensis* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 152; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 166 (= *Sadocus aquifugus* Mello-Leitão, 1931).

*leptes marmoratus* (Mello-Leitão, 1933), de que *Paragonyleptes pictus* Piza, 1942, se tornaria sinônimo?

Surge aqui um caso não previsto nas regras de Nomenclatura Zoológica. Respondendo às duas perguntas feitas no fim do parágrafo anterior, parece-me que a homonímia não desapareceu e dentro do gênero continua a haver duas espécies com o nome de *marmoratus*, se bem que uma delas na sinonímia de *fallax*. Mantenho *Paragonyleptes pictus* Piza, 1942, baseado no seguinte argumento: de acôrdo com as regras de Nomenclatura Zoológica, não se pode descrever uma espécie dentro de um determinado gênero, com um nome que já foi usado, mesmo que este nome tenha desaparecido por sinonímia.

Restaurar *Paragonyleptes marmoratus* (Mello-Leitão, 1933) também seria admissível, porque não iria trazer confusão nenhuma. Mas julgo que, mantendo *Paragonyleptes pictus* Piza, 1942, estamos mais de acôrdo com as regras de Nomenclatura.

(1) *Acanthogonyleptes* Mello-Leitão, 1922, é, evidentemente, sinônimo de *Paragonyleptes* Roewer, 1913. A sinonímia deste último gênero (Cf. Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 4 (17): 252) deve-se, pois, juntar *Acanthogonyleptes* Mello-Leitão, 1922 (= *Nygoleptes* Mello-Leitão, 1931).



*Sadocus aquifugus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33; 136, fig. 8.

*Parasadocus catharinensis*, in Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Mac., 3 (2): 20.

a) N.º 1.510. 6 exemplares. Tipos. Joinville (Santa Catarina).

b) N.º 11.390. Santa Catarina. Tipos de *Sadocus aquifugus* Mello-Leitão, 1931.

**170. *Stephanocranion bimaculatus* Mello-Leitão.**

*Stephanocranion bimaculatus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 124, fig. 3.

N.º 11.384. 1 exemplar. Tipo. Terezópolis (Rio de Janeiro), RIBEIRO col.

O habitat indicado na diagnose original é outro: Jacarepaguá (Rio de Janeiro), não estando mencionado quem coligiu o material.

**171. *Therezopolis roseus* Mello-Leitão.**

*Therezopolis roseus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 26, fig. 21 e 22 (Sep.).

N.º 42.692. Macho e fêmea. Tipos. Petrópolis (Rio de Janeiro). R, ARLÉ col.

**172. *Therezopolis therezopolis* Mello-Leitão.**

*Therezopolis therezopolis* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 133; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 169 (= *Therezopolis viridilimbatus* (Roewer, 1927) = *Paraorguesia albiornata* Mello-Leitão, 1927).

*Vitiches viridilimbata* Roewer, 1927, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges., 40: 347, fig. 15.

*Paraorguesia albiornata* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 17.

a) 1 fêmea. Material sêco (de exposição). Determinada como sendo um macho de *Therezopolis viridilimbatus* (Roewer, 1927). Cf. Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 460.

b) N.º 1.487 (número 880 da coleção MELLO-LEITÃO). 1 fêmea. Niterói (Rio de Janeiro). Tipo de *Paraorguesia albiornata* Mello-Leitão, 1927. Esta fêmea havia sido considerada como macho, como se lê em sua diagnose original.

O tipo de *Therezopolis therezopolis* Mello-Leitão, 1923, conforme já tive oportunidade de comentar, não existe mais. Cf. Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 170.

**173. *Triaenosoma bahiensis* Mello-Leitão.**

*Triaenosoma bahiensis* Mello-Leitão, 1926, Rev. Mus. Paul., 14: 52 (Sep.).

N.º 1.482. 3 exemplares. Tipos. Bahia.

Na diagnose original está indicado que o material foi coligido por W. S. BRISTOWE.

**174. *Triaenosoma singularis* Roewer.**

*Triaenosoma singularis* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 182, fig. 76.

a) N.º 1.456. 10 exemplares. Tapera (Pernambuco).

b) N.º 1.476 (ou 764). 1 exemplar. Bahia.

c) N.º 5.688 (ou 42.328). Pernambuco. IHERING col.

d) N.º 1.518. Tapera (Pernambuco).

e) N.º 42.706. Pernambuco. IHERING col.

**175. Urodiabunus arlei** Mello-Leitão.

*Urodiabunus arlei* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 397, fig. 22.

N.º 42.476. Macho e fêmea. Tipos. Independência, Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

Na diagnose original não há referência à fêmea, bem como não há indicação da localidade Independência, em Petrópolis.

**176. Xundarava anomala** Mello-Leitão.

*Xundarava anomala* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 13, fig. 10 (Sep.).

N.º 42.282. 1 macho e 2 fêmeas. Antonina (Paraná). F. LANGE col.

São os tipos, sem dúvida, se bem que o seu número, na diagnose original, seja 42.281.

**177. Xundarava holacantha** Mello-Leitão.

*Xundarava holacantha* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 20.

N.º 469 (ou 993 ou 55). 1 exemplar. Tipo. Niterói (Rio de Janeiro).

**178. Ziltaia nigrifemur** Mello-Leitão.

*Ziltaia nigrifemur* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 27, fig. 23 (Sep.).

N.º 42.230. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

Trata-se, sem dúvida, do tipo, apesar do seu número, na diagnose original, ser diferente (42.267).

## VI. Subfamília MITOBATINAE

**179. Ancistrotellus bifurcatus** (C. L. Koch).

*Ancistrotus bifurcatus* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 45, fig. 559 (fêmea).

N.º 1.529. 1 exemplar. Rio de Janeiro.

**180. Ancistrotellus bipustulatus** Mello-Leitão.

*Ancistrotellus bipustulatus* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 26, fig. 28.

N.º 417. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

Não sei se se trata do tipo, pois êste deve ter o número 53.922, e foi coligido em Saí (Rio de Janeiro) por J. COUCEIRO, segundo os dados da diagnose original.

**181. Ancistrotellus bristowei** (Mello-Leitão).

*Ancistrotus bristowei* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93: 183, fig. 5 e 6.



N.º 1.523 (ou 839 da coleção MELLO-LEITÃO). 2 exemplares. Tipos. Diamantina (Minas Gerais).

Na descrição original da espécie está indicado que o material foi coligido por W. S. BRISTOWE.

182. **Ancistrotellus dubius** Mello-Leitão.

*Ancistrotellus dubius* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 393, fig. 257.

- a) N.º 42.227. 4 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.
- b) N.º 42.229. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). J. COUCEIRO col.
- c) N.º 1.533. 2 exemplares. Rio de Janeiro.

Parece-me que os dois exemplares, número 1.533, são os tipos.

183. **Ancistrotellus intermedius** Mello-Leitão.

*Ancistrotellus intermedius* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 37, fig. 33 (Sep.).

N.º 42.694. 3 exemplares. Tipos. Antonina (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.

184. **Ancistrotellus obscurus** Mello-Leitão.

*Ancistrotellus obscurus* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 96.

N.º 1.530. 1 exemplar. Tipo. Pinheiro (Rio de Janeiro).

185. **Ancistrotellus squalidus** (Perty).

*Goniosoma squalidum* Perty, 1832, Delect. An. Artic., p. 202, n.º 2.

N.º 1.534. 1 exemplar. Rio de Janeiro.

186. **Asarcus ingenuus** (Mello-Leitão).

*Bogdana ingenua* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 27, fig. 29.

N.º 127. 1 exemplar. Tipo. Campos de Jordão (São Paulo).

187. **Cnemoleptes passarellii** Mello-Leitão.

*Cnemoleptes passarellii* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4): 440.

N.º 196. 3 exemplares. Tipos Barro Branco (Rio de Janeiro). G. PASSARELLI col.

188. **Iporangaia pustulosa** Mello-Leitão.

*Iporangaia pustulosa* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 26, fig. 19.

N.º 41.801. 7 exemplares. Tipos. Rio Iporanga (São Paulo). OTON LEONARDOS col.

189. **Metaroeweria insignis** Mello-Leitão.

*Metaroeweria insignis* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 39, fig. 34.

N.º 42.551. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). J. COUCEIRO col.

Trata-se, sem dúvida, do tipo, se bem que haja discordância do número com o da diagnose original, o qual é 42.831.

190. **Mitobates stygnoides** Mello-Leitão.

*Mitobates stygnoides* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 163.

a) N.º 1.528 (número 772 da coleção MELLO-LEITÃO). 6 exemplares. Tipos. Rio de Janeiro. E. DE MORAIS MELO col.

- b) N.º 1.519. 4 exemplares. Tipos. Rio de Janeiro.
- c) N.º 1.524. 1 exemplar. Rio de Janeiro.
- d) N.º 1.522. 2 exemplares. Tipos.
- e) N.º 1.525. 3 exemplares.

Na diagnose original está especificada a localidade-tipo: Tijuca (Rio de Janeiro).

191. **Neoancistrotus nigripes** Mello-Leitão.

*Neoancistrotus nigripes* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 25, fig. 18.

N.º 41.936. 1 exemplar. Tipo. Ribeira do Iguape. OTON LEONARDOS col.

No final da descrição da espécie, o número dado ao tipo é 41.814, pelo que não confere com o número do rótulo do espécime.

192. **Neoancistrotus nigromaculatus** Mello-Leitão.

*Neoancistrotus nigromaculatus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 143, fig. 19.

a) N.º 18.208. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

b) N.º 41.823. 2 exemplares. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

193. **Neoancistrotus thiacanthus** Mello-Leitão.

*Neoancistrotus thiacanthus* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 21.

N.º 1.520 (ou 934). 1 exemplar. Tipo. Niterói (Rio de Janeiro).

194. **Neomitobatoides rosae** Mello-Leitão.

*Neomitobatoides rosae* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 149, fig. 15.

N.º 27.065. 2 exemplares. Tipos. Realengo (Rio de Janeiro). MÁRIO ROSA col.

195. **Promitobates difficilis** (Mello-Leitão).

*Batomites difficilis* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 141, fig. 11.

N.º 11.395. 9 exemplares. Tipos. Santa Catarina.

Na diagnose original está indicado que o material foi coligido por DALIBUR HANSEL.

196. **Promitobates heteracanthus** (Mello-Leitão).

*Batomites heteracanthus* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 27, fig. 20.

N.º 41.810. 2 exemplares. Tipos. Ribeira do Iguape. OTON LEONARDOS col.

197. **Promitobates nitidus** (Mello-Leitão).

*Leonardosia nitida* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 28, fig. 21.

a) N.º 41.803. 1 exemplar. Tipo. Ribeira do Iguape. OTON LEONARDOS col.

b) N.º 42.204. 1 fêmea. Iporanga. OTON LEONARDOS col.

198. **Promitobates ornatus** (Mello-Leitão).

*Neomitobates ornatus* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 343.

*Promitobatoides ornatus*, in Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 21 e 22.



*Promitobates ornatus*, in Soares, 1943, Boletim de Indústria Animal, São Paulo, n. s., 6 (3): 56 (= *Batomites spitzzi* Mello-Leitão, 1931 = *Batomites intermedius* Mello-Leitão, 1935 = *Batomites nitidus* Mello-Leitão, 1940).

*Batomites spitzzi* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 142, fig. 12.

*Batomites intermedius* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 409, fig. 31.

*Batomites nitidus* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 29, fig. 31.

a) N.º 1.531. 8 exemplares. São Paulo.

b) N.º 11.394. 1 exemplar. Alto da Serra (São Paulo). R. SPITZ col. Tipo de *Batomites spitzzi* Mello-Leitão, 1931.

c) N.º 42.323. 2 exemplares. Minas do Iporanga (São Paulo). RUI DE LIMA E SILVA col. Determinados como *Batomites intermedius* Mello-Leitão, 1935 (tipos). O número não coincide com o da diagnose original, o qual é 41.998.

d) N.º 1.569. 16 exemplares. Determinados como *Batomites intermedius* Mello-Leitão, 1935.

199. **Roeweria bittencourti** Mello-Leitão.

*Roeweria bittencourti* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 167.

N.º 1.526. 4 exemplares. Tipos. Joinville (Santa Catarina).

## VII. Subfamília PACHYLINAE

200. **Apembolephaenus jorgei** Holmberg.

*Apembolephaenus jorgei* Holmberg, 1909, Apunt. Hist. Nat. Buenos Aires, 1: 38-39.

a) N.º 1.415. 20 exemplares. Buenos Aires (Argentina). J. CANALS leg.

b) N.º 11.375. Santa Fé (Argentina).

201. **Apembolephaenus setulosus** Mello-Leitão.

*Apembolephaenus setulosus* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 149, fig. 16.

a) N.º 26.924. Tipo. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.

b) N.º 42.437. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.

202. **Arruda insignis** Mello-Leitão.

*Arruda insignis* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 3, fig. 4.

N.º 58.322. 3 exemplares. Tipos. Jussaral, Angra dos Reis (Rio de Janeiro). BERLA col.

203. **Berlaia dissimilis** Mello-Leitão.

*Berlaia dissimilis* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 10, fig. 12.

N.º 65. 1 exemplar. Mangaratiba (Rio de Janeiro).

A procedência e o número estão em desacôrdo com a diagnose original. Nesta o habitat é Jussaral e o número 58.320. A localidade-tipo Mangaratiba é a indicada para outra espécie de *Berlaia* Mello-Leitão, 1940, *Berlaia spinulosa* Mello-Leitão, 1940, que não foi encontrada no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

204. **Breslavius hirsutus** Mello-Leitão.

*Breslavius hirsutus* Mello-Leitão, 1935, An. Acad. Bras. Cien., 7 (1): 7, fig. 4, 4 a.

N.º 42.329 (o número da diagnose original é 42.327). 5 exemplares. Tipos. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

A localidade-tipo está indicada, no final da diagnose original, como sendo Independência, Petrópolis (Rio de Janeiro).

205. **Bristoweia diamantinae** Mello-Leitão.

*Bristoweia diamantinae* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93: 180, fig. 1.

N.º 1.402 (ou 843 da coleção MELLO LEITÃO). 3 exemplares. Tipos. Diamantina (Minas Gerais).

Na descrição da espécie está indicado que o material foi coligido por W. S. BRISTOWE.

206. **Bristoweia zorodes** Mello-Leitão.

*Bristoweia zorodes* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93:180.

N.º 1.481 (número 844 da coleção MELLO LEITÃO). 1 exemplar. Tipo. Santos (São Paulo).

O habitat indicado na descrição da espécie (Diamantina — Minas Gerais, material coligido por W. S. BRISTOWE) é muito diferente do que se lê no rótulo do tipo (Santos — S. Paulo).

207. **Bunostigma singularis** Mello-Leitão.

*Bunostigma singularis* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 10, fig. 2.

a) N.º 41.788. 8 exemplares. Tipos. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

b) N.º 42.677. 2 exemplares. Rio de Janeiro. R. ARLÉ col.

208. **Camposicola altifrons** Mello-Leitão.

*Camposicola altifrons* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93: 182, fig. 2. 3.

N.º 1.485. 1 exemplar. Tipo. Campos (Rio de Janeiro). W. S. BRISTOWE col.

209. **Carampangue ingens** Mello-Leitão.

*Carampangue ingens* Mello-Leitão, 1937, Rev. Chil. Hist. Nat., año 41: 152, fig. 14, 15.

Macho e fêmea. Tipos. Carampangue (Chile). W. REED col. Material seco (de exposição).

210. **Cezarella bimaculata** Mello-Leitão.

*Cezarella bimaculata* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 214.

N.º 1.388. 1 exemplar. Tipo. Pedras Altas (Rio Grande do Sul).

A diagnose original diz que o material foi coligido por CESAR PINTO.



211. ***Currula spinifrons* Roewer.**

*Currula spinifrons* Roewer, 1927, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges., 40: 340, fig. 7.

N.º 42.376. 2 exemplares. Belo Horizonte (Minas Gerais).

212. ***Discocyrtus affinis* Roewer.**

*Discocyrtus affinis* Roewer, 1913 Arch. Naturg., 79 A (4): 117, fig. 54.

N.º 1.421. 2 exemplares. Diamantina (Minas Gerais).

213. ***Discocyrtus alticola* Mello-Leitão.**

*Discocyrtus alticola* Mello-Leitão, 1935, An. Acad. Bras. Cien., 7 (1): 6, fig. 3.

N.º 18.198. 1 exemplar. Tipo. Itatiáia. PADBERG col.

214. ***Discocyrtus bos* Roewer. (1)**

*Discocyrtus bos* Roewer, 1929, Abh. Nat. Ver. Brem., 27 (2): 210, fig. 11 (a, b).

a) N.º 1.426. 1 exemplar. Varginha (Minas Gerais).

b) N.º 1.427. 6 exemplares. Três Corações (Minas Gerais).

(1) Esta espécie deve pertencer a ROEWER, pois, segundo me demonstrou o SR. ROMUALDO FERREIRA DE ALMEIDA, incontestavelmente grande autoridade em questões de Nomenclatura Zoológica, se se desse a espécie a MELLO-LEITÃO, ir-se-ia contra o artigo 25 das Regras Internacionais de Nomenclatura Zoológica, que diz o seguinte:

Artigo 25 — O nome válido de um gênero ou espécie só pode ser aquele sob que um gênero ou espécie foi primeiro designado, contanto que:

a) Tal nome tenha sido publicado e acompanhado de uma indicação, ou definição, ou descrição; e

b) O autor tenha aplicado os princípios de nomenclatura binária.

Este artigo 25 foi transcrito de: "Regras Internacionais de Nomenclatura Zoológica", tradução para o português por AFRÂNIO DO AMARAL, 2.ª edição, in Mem. Inst. But., 11 (1937): 249.

O PROF. MELLO-LEITÃO enviou a ROEWER cótipos de uma nova espécie de *Discocyrtus* Holmberg, 1878, a que denominou *Discocyrtus bos*, mas não publicou nem o nome nem nenhuma descrição.

ROEWER, baseado nestes cótipos, descreveu-a e publicou a descrição, fazendo-a acompanhar de duas figuras, e pondo adiante do seu nome (*Discocyrtus bos*) o nome do autor da espécie (MELLO-LEITÃO), o que não podia fazer, uma vez que a espécie ainda não havia sido descrita. MELLO LEITÃO, em sua monografia dos Opiliões do Brasil, em 1932 (p. 174), colocou adiante de *Discocyrtus bos* seu nome, MELLO-LEITÃO, seguido da data em que ROEWER a descreveu (1929), o que também não podia ter feito, porque a espécie foi descrita por Roewer.

Se MELLO-LEITÃO tivesse enviado a ROEWER os cótipos com o nome de *Discocyrtus bos*, acompanhados de uma descrição, e ROEWER tivesse apenas traduzido a diagnose de MELLO-LEITÃO e publicado, creio que, só assim, poderia MELLO-LEITÃO ganhar a espécie. Mas ROEWER declara que baseou sua descrição nos cótipos enviados por MELLO-LEITÃO, como transcreverei a seguir: "(Diese Tiere erhielt ich als *Cotyphus* unter obigem Namen von Herrn Dr. Mell.-Leit.; eine Diagnose habe ich in der Literatur nicht gefunden.)"

Caso semelhante se dá com as espécies póstumas. Quando um autor, depois de falecido, deixa manuscritos de descrições de espécies, com nomes já escolhidos (de acôrdo com as leis de nomenclatura binária), indicando onde estão os tipos, mesmo que outro autor publique-as, cabe ao primeiro a prioridade, de acôrdo com a opinião 4 (Op. cit., pág. 259). O segundo nada fez mais que revêr ou traduzir o texto e encaminhá-lo à imprensa. Mas um autor, já falecido, que tenha deixado apenas espécimes zoológicos, determinados como espécie nova, com nome específico escolhido de acôrdo com as leis de nomenclatura binária, designando tipos, jamais ganha a espécie se não tiver deixado em seus manuscritos uma descrição. A espécie será de quem a completar, fazendo-a acompanhar de uma descrição, e dando-a à publicidade. E' o que se chama espécie "*in litteris*" ou "*in schedula*" do autor que a deixou sem descrição, apenas tendo dado o nome e designado o tipo.

215. **Discocyrtus bucki** Mello-Leitão.  
*Discocyrtus bucki* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 33, fig. 26.  
N.º 41.949. 3 exemplares. Tipos. Itapiranga (Sta. Catarina). PE. Pío BUCK col.
216. **Discocyrtus coronatus** Mello-Leitão.  
*Discocyrtus coronatus* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 32, fig. 25.  
N.º 41.950. 1 exemplar. Tipo. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul). PE. Pío BUCK col.
217. **Discocyrtus coxalis** Roewer.  
*Discocyrtus coxalis* Roewer, 1929, Abh. Nat. Ver. Brem., 27 (2): 206, fig. 8.  
N.º 41.400. 2 exemplares. Itatiáia. PADBERG col.
218. **Discocyrtus crenulatus** Roewer.  
*Discocyrtus crenulatus* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 111, fig. 51.  
a) N.º 1.417. 2 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro). Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 124.  
b) N.º 1.424. 1 exemplar. Rio Grande do Sul. CESAR PINTO col.
219. **Discocyrtus curvipes** (C. L. Koch).  
*Gonyleptes curvipes* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 36, fig. 555.  
N.º 1.430. 1 exemplar. Joinville (Santa Catarina). Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 124-125.
- Esta espécie já havia sido assinalada em Blumenau (Santa Catarina) (Cf. Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 401). Mas o material desta espécie que existe no Museu Nacional provém de Joinville (Santa Catarina), segundo o rótulo do exemplar.
220. **Discocyrtus frersi** Mello-Leitão.  
*Discocyrtus frersi* Mello-Leitão, 1933, An. Acad. Bras. Cien., 5 (2): 58.  
N.º 1.416. 2 exemplares. Cótipos. Argentina.
- A diagnose original especifica a localidade-tipo: Prov. de Buenos Aires, ARTURO FRERS col.
221. **Discocyrtus hamatus** Roewer.  
*Discocyrtus hamatus* Roewer, 1915, Arch. Naturg., 81 A (3): 98, fig. 53.  
N.º 41.652. 2 exemplares. Rio Grande do Sul. RAMBO col.
222. **Discocyrtus heteracanthus** Mello-Leitão.  
*Discocyrtus heteracanthus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 7, fig. 5 (Sep.).  
N.º 42.278. 5 exemplares. Tipos. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE col.
223. **Discocyrtus iguapei** Mello-Leitão.  
*Discocyrtus iguapei* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 15, fig. 7.  
a) N.º 41.808. 2 exemplares. Ribeira do Iguape (São Paulo). OTON LEONARDO col.



Suponho que êstes espécimes sejam os tipos, não obstante o seu número, indicado na diagnose original, ser 41.812.

b) N.º 467. 1 exemplar.

224. **Discocyrtus infelix** Mello-Leitão.

*Discocyrtus infelix* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 7, fig. 9; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 172 (= *Discocyrtus textor* Piza, 1943).

*Discocyrtus textor* Piza, 1943, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3: 53, fig. 8.

N.º 181. Tipo. Mangaritiba (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

225. **Discocyrtus laevis** Mello-Leitão.

*Discocyrtus laevis* Mello-Leitão, 1931, An. Acad. Bras. Cien., 3 (2): 87.

N.º 1.432. 1 exemplar. Cótipo. Santa Fé (Argentina).

226. **Discocyrtus langei** Mello-Leitão.

*Discocyrtus langei* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 6, fig. 4 (Sep.).

N.º 42.275. 4 exemplares. Tipos. Cachoerinha (Paraná). F. LANGE col.

227. **Discocyrtus leonardosi** Mello-Leitão.

*Discocyrtus leonardosi* Mello-Leitão, 1935, An. Acad. Bras. Cien., 7 (1): 6, fig. 2.

N.º 42.208. 1 exemplar. Tipo. Paraná. OTON LEONARDOS col.

A diagnose original especifica a localidade-tipo: Serro Azul (Paraná).

228. **Discocyrtus littoralis** Mello-Leitão.

*Discocyrtus littoralis* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 172, fig. 91.

a) N.º 1.422. 1 exemplar. Tipo. São Sebastião (São Paulo).

b) N.º 58.449. 4 exemplares. Ilha de São Sebastião (São Paulo). LANE col.

c) N.º 56.448. 5 exemplares. Ilha de São Sebastião (São Paulo). LANE col.

d) N.º 147. 1 exemplar. Pinheiro (São Paulo). E. BRAGA col.

229. **Discocyrtus melanacanthus** Mello-Leitão.

*Discocyrtus melanacanthus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 178, fig. 98.

N.º 1.425. 1 exemplar. Tipo. Ouro Preto (Minas Gerais).

Na diagnose original está indicado que o material foi coligido por CARLOS TOMAZ DE MAGALHÃES GOMES.

230. **Discocyrtus moraesianus** Mello-Leitão.

*Discocyrtus moraesianus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 125.

a) N.º 1.429. 1 exemplar. Tipo.

O tipo de *Discocyrtus moraesianus* Mello-Leitão, 1923, segun-

do a diagnose original, foi coligido em Tijuca (Rio de Janeiro), por E. DE MORAIS MELO.

b) N.º 53.921. 1 exemplar. Tijuca (Rio de Janeiro).

**231. *Discocyrtus nigrolineatus* (Mello-Leitão).**

*Discocyrtanus nigrolineatus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 381, fig. 11.  
N.º 42.428. 1 exemplar. Tipo. Angra dos reis (Rio de Janeiro). J. LINS col.

A diagnose original especifica o habitat: Jussaral, Angra dos Reis (Rio de Janeiro).

**232. *Discocyrtus perfidus* Mello-Leitão.**

*Discocyrtus perfidus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 181, fig. 103.

N.º 1.419. 2 exemplares. Tipos. Niterói (Rio de Janeiro).

**233. *Discocyrtus prospicius* (Holmberg).**

*Gonyleptes prospicius* Holmberg, 1876, An. Agric. Argent., 4: 86.

a) N.º 1.418. 16 exemplares. Parque 3 de Febrero, cidade de Buenos Aires. (Argentina). J. CANALS leg.

b) N.º 1.431. 2 exemplares. Buenos Aires (Argentina).

**234. *Discocyrtus semipartitus* Mello-Leitão.**

*Discocyrtus semipartitus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 173.  
N.º 1.420. 1 exemplar. Tipo. Itatiáia.

**235. *Discocyrtus subinermis* Mello-Leitão.**

*Discocyrtus subinermis* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 8, fig. 6 (Sep.).

N.º 42.279. 8 exemplares. Tipos. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE col.

**236. *Discocyrtus tenuis* Roewer.**

*Discocyrtus tenuis* Roewer, 1916, Arch. Naturg. 82 A (2): 116, fig. 9.

N.º 42.686. 1 exemplar. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

**237. *Eopachylus ignotus* Mello-Leitão.**

*Eopachylus ignotus* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 94.

a) N.º 1.386. 1 exemplar. Tipo. Pinheiro (Rio de Janeiro).

b) N.º 41.937. 1 exemplar. Curitiba (Paraná). FR. ZENO ROHR col.

**238. *Eusarcus aduncus* (Mello-Leitão).**

*Enantiocentron aduncum* Mello-Leitão, 1942, Bol. Mus. Nac., 14-17 (1938-1941): 7, fig. 5.

N.º 58.207. 9 exemplares. Colatina (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

Na descrição da espécie, o número dos tipos é 55.093, procedentes de Colatina e Goitacazes (Espírito Santo).

**239. *Eusarcus antoninae* Mello-Leitão.**

*Eusarcus antoninae* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 4, fig. 2 (Sep.).

N.º 42.274. 1 exemplar. Tipo. Antonina (Paraná). F. LANGE col.



240. **Eusarcus armatus** Perty.

*Eusarcus armatus* Perty, 1832, Delect. An. Artic. p. 203, n.º 3 (macho)

a) N.º 1.435. 1 exemplar. Pinheiro (Rio de Janeiro).

b) N.º 1.434 (ou 775). 1 exemplar. Tijuca (Rio de Janeiro). Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 121.

c) N.º 1.437. 1 fêmea.

d) N.º 58.038. 1 exemplar. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

241. **Eusarcus centromelos** (Mello-Leitão).

*Pareusarcus centromelos* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 13.

*Enantiocentron geniculatus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 22, fig. 18 (Sep.).

*Eusarcus centromelos*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 174 (= *Eusarcus geniculatus* (Mello-Leitão, 1936)).

a) N.º 41.832. 1 exemplar. Tipo. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col. No rótulo deste tipo estava escrito *Eusarculus chelocentrus*.

b) N.º 42.690. 1 fêmea. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col. Tipo de *Eusarcus geniculatus* (Mello-Leitão, 1936).

242. **Eusarcus curvispinosus** Mello-Leitão.

*Eusarcus curvispinosus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 122.

N.º 1.438. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro).

243. **Eusarcus doriphorus** (Mello-Leitão).

*Enantiocentron doriphorus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 450, fig. 11.

a) N.º 1.391. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

b) N.º 58.236. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

c) N.º 58.326. 5 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

d) N.º 5.392. 3 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). J. COUCEIRO col.

e) N.º 1.540. 4 exemplares. Distrito Federal. J. MOOJEN col.

244. **Eusarcus hastatus** Soerensen.

*Eusarcus hastatus* Soerensen, 1884, Naturh. Tidsskr., 14: 625.

a) N.º 58.044. 2 exemplares. Viçosa (Minas Gerais). J. MOOJEN col.

b) N.º 102. 3 exemplares. Espírito Santo.

245. **Eusarcus minensis** Mello-Leitão.

*Eusarcus minensis* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 158, fig. 82.

N.º 1.436. 1 exemplar. Tipo. Ouro Preto (Minas Gerais).

Na diagnose original, o habitat dado para o tipo é Caxambu (Minas Gerais) e não Ouro Preto.

246. **Eusarcus montis** (Mello-Leitão).

*Enantiocentron montis* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 23, fig. 19 (Sep.).

a) N.º 42.693. 2 exemplares. Tipos. Petrópolis (Rio de Janeiro) R. ARLÉ col.

b) N.º 268. 1 exemplar. Santa Bárbara, Distrito Federal (Rio de Janeiro).

247. **Eusarcus nigrimaculatus** Mello-Leitão.

*Eusarcus nigrimaculatus* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93: 181.

a) N.º 1.439. 2 exemplares.

b) N.º 1.439. 2 exemplares. Pinheiro (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

c) N.º 58.329. 3 machos e 2 fêmeas, Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

No final da diagnose original o habitat indicado para o tipo é Diamantina (Minas Gerais), material coligido por W. S. BRISTOWE. Não encontrei exemplares desta espécie com tal procedência no Museu Nacional. Havia, como enumerei acima, três tubos com opiliões desta espécie, dois deles com o mesmo número (1.439), dos quais um sem indicação da procedência.

248. **Eusarcus oxyacanthus** C. L. Koch.

*Eusarcus oxyacanthus* C. L. Koch, 1839, Arach., 7: 7, fig. 543, 544; Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 122.

a) N.º 1.433. 1 exemplar. Rio de Janeiro. E. DE MORAIS MELO col.

b) N.º 58.215. 1 exemplar. Goitacazes (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

c) N.º 42.349. 3 exemplares. Friburgo (Rio de Janeiro). MÁRIO ROSA col.

d) N.º 451. 4 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

e) N.º 243. 4 exemplares. Rio de Janeiro.

249. **Eusarcus pusillus** Mello-Leitão. (1)

*Eusarcus pusillus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 120, fig. 2.

N.º 11.376. 1 exemplar. Tipo. Rodeio (Santa Catarina).

250. **Eusarcus spinimanu** Mello-Leitão.

*Eusarcus spinimanu* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 159, fig. 83.

N.º 1.428. 3 exemplares. Tipos. Niterói (Rio de Janeiro).

A espécie foi descrita como sendo de Minas Gerais. Não obstante, a procedência indicada no rótulo é Niterói (Rio de Janeiro).

251. **Flangeia validissima** Mello-Leitão.

*Flangeia validissima* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 136, fig. 3.

N.º 27.320. 2 exemplares. Tipos. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORAES col.

252. **Goitacazia pulchra** Mello-Leitão.

*Goitacazia pulchra* Mello-Leitão, 1942, Bol. Mus. Nac., 14-17 (1938-1941): 8, fig. 6.

N.º 58.211. 1 exemplar. Colatina (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

---

(1) É necessário que o PROF. MELLO-LEITÃO dê nome novo a esta sua espécie, porque *Eusarcus pusillus* é nome que já foi usado por SOERENSEN, em 1884.



No final da descrição da espécie, está declarado que os tipos têm o número 58.210, tendo por habitat Colatina e Goitacazes (Espírito Santo).

253. **Guaranilia nigrosulcata** Mello-Leitão.  
*Guaranilia nigrosulcata* Mello-Leitão, 1937, Mem. Inst. But., 11: 281, fig. 4  
a) N.º 58.030. 1 exemplar. Carambei (Paraná). F. LANGE col.  
b) N.º 132. 2 exemplares. Carambei (Paraná).
254. **Guaraniticus lesserti** Mello-Leitão.  
*Guaraniticus lesserti* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 134, fig. 2.  
a) N.º 27.174. 3 exemplares. Tipos. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.  
b) N.º 42.439. 3 exemplares. Curitiba (Paraná). F. LANGE col.
255. **Guascaia ypsilonota** Mello-Leitão.  
*Guascaia ypsilonota* Mello-Leitão, 1935, An. Acad. Bras. Cien., 7 (1): 1, fig. 1.  
N.º 41.936. 3 exemplares. Tipos. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul). PE. Pío BUCK col.
256. **Gyndesoides dispar** Mello-Leitão.  
*Gyndesoides dispar* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 133, fig. 1; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 177 (= *Klobinia infuscata* Mello-Leitão, 1936).  
*Klobinia infuscata* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 5, fig. 3 (Sep.).  
a) N.º 27.066. 4 exemplares. Tipos. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.  
b) N.º 42.280. 1 exemplar. Antonina (Paraná). F. LANGE col. Tipo de *Klobinia infuscata* Mello-Leitão, 1936.
257. **Gyndoides elaphus** Mello-Leitão.  
*Gyndoides elaphus* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 413.  
N.º 1.390. 9 exemplares. Tipos. Blumenau (Santa Catarina).
258. **Heteropachyloidellus dimorphicus** Mello-Leitão.  
*Heteropachyloidellus dimorphicus* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 15.  
a) N.º 1.465 (ou 954). 2 exemplares. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul).  
b) N.º 56.268 (ou 7.936). 21 exemplares. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul). PE. Pío BUCK col.
259. **Heteropachyloidellus marginatus** Mello-Leitão.  
*Heteropachyloidellus marginatus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 150.  
a) N.º 1.410. 1 exemplar. Tipo. Rio Grande do Sul. CESAR PINTO col.  
b) N.º 58.060. 7 exemplares. São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul). R. GLIESCH col.  
c) N.º 41.603. 5 exemplares. Rio Grande do Sul. RAMBO col.

Na diagnose original a localidade do tipo está especificada .  
Pedras Altas (Rio Grande do Sul).

160. **Heteropachyloidellus paucigranulatus** Mello-Leitão.  
*Heteropachyloidellus paucigranulatus* Mello-Leitão, 1931, An. Acad. Bras. Cien., 3 (2) : 88.  
a) N.º 1.413. 1 macho. Cótipo. Carmelo (Uruguay).  
b) N.º 58.394. 12 exemplares. Montevideo (Uruguay). CORDERO col.  
c) N.º 1.414. 14 exemplares. Montevideo (Uruguay). MELLO-LEITÃO col.
261. **Heteropachyloidellus serrulatus** Mello-Leitão.  
*Heteropachyloidellus serrulatus* Mello-Leitão, 1931, An. Acad. Bras. Cien., 3 (2) : 8, fig. 5.  
a) N.º 1.411. 6 exemplares. Buenos Aires (Argentina).  
b) N.º 1.412. 1 exemplar. Cótipo. Entre Rios (Argentina).  
c) N.º 58.395. 5 exemplares. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul). PE. PIO BUCK col.  
d) N.º 41.947. 10 exemplares. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul). RAMBO col.  
Na diagnose original está especificada a localidade-tipo: Concordia, Entre Rios (Argentina).
262. **Heteropucroliia nigrosulcata** Mello-Leitão.  
*Heteropucroliia nigrosulcata* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.) : 452, fig. 12.  
N.º 1.400. 1 exemplar. Tipo. Itatiáia (Rio de Janeiro).  
Na diagnose original está indicado que o material foi coligido por ZIKAN.
263. **Huralvius incertus** Mello-Leitão.  
*Huralvius incertus* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9 : 382, fig. 12.  
N.º 42.440. 1 exemplar. Cochoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col.
264. **Iguassua humilis** Mello-Leitão.  
*Iguassua humilis* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9 : 380, fig. 10.  
N.º 42.438. 1 exemplar. Tipo. Iguassu. LANGE col.  
No final da descrição da espécie o habitat indicado é Cachoeirinha (Paraná) e não Iguassu, como está no rótulo.
265. **Jacarepaguana berlae** Mello-Leitão.  
*Jacarepaguana berlae* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.) : 451, fig. 11.  
a) N.º 1.395. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).  
b) N.º 58.398. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.  
Na diagnose original está declarado que o tipo foi coligido por BERLA.
266. **Liogyndulus luteifemur** Mello-Leitão.  
*Liogyndulus luteifemur* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.) : 140.  
2 exemplares. Tipos. Itatiáia. BRUNO LOBO col. Material sêco (de exposição).
267. **Lyopachylus mitobatoides** Mello-Leitão.  
*Lyopachylus mitobatoides* Mello-Leitão, 1926, Rev. Mus. Paul., 14 : 51 (Sep.).  
N.º 1.396. 2 exemplares. Tipos. Santa Catarina.



268. **Mangaratiba monstrosa** Mello-Leitão.

*Mangaratiba monstrosa* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 2, fig. 2, 3.

N.º 90. 1 exemplar. Rio de Janeiro.

Deve ser o tipo. Na diagnose original o habitat indicado é Mangaratiba — Distrito Federal.

269. **Melloleitaella canalsi** (Mello-Leitão).

*Canestrinia canalsi* Mello-Leitão, 1931, An. Acad. Bras. Cien., 3 (2): 89.

N.º 1.403. 3 exemplares. Tipos. Buenos Aires (Argentina). JOSÉ CANALS col.

No rótulo estava escrito *Canestrinia serripes*, naturalmente o primeiro nome proposto e não publicado, sendo substituído por *Canestrinia canalsi*.

270. **Metabalta porteri** Mello-Leitão.

*Metabalta porteri* Mello-Leitão, 1936, Rev. Chil. Hist. Nat., año 40: 113, pr. 10.

N.º 50.221. Tipo. Constitucion (Chile). PORTER col.

271. **Metadiscocyrtus fornicatus** (Soerensen).

*Discocyrtus fornicatus* Soerensen, 1884, Naturh. Tidsskr., 14: 633.

N.º 1.423 (ou 776). 1 exemplar. Petrópolis (Rio de Janeiro). BORGMEIER col. Cf. Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 125.

272. **Metagraphinotus arlei** Mello-Leitão.

*Metagraphinotus arlei* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 12, fig. 4, 4 a.

N.º 41.569. Tipo. Distrito Federal. R. ARLÉ col.

Na descrição da espécie o habitat está mais especificado: Gávea (Distrito Federal).

273. **Metagraphinotus catharinensis** Mello-Leitão.

*Metagraphinotus catharinensis* Mello-Leitão, 1927, Rev. Mus. Paul., 15: 412.

N.º 1.401. 3 exemplares. Devem ser os tipos, que, segundo a diagnose original, foram coligidos em Blumenau (Santa Catarina).

274. **Metagyndes longispina** Mello-Leitão.

*Metagyndes longispina* Mello-Leitão, 1936, Rev. Chil. Hist. Nat., año 40 (1936): 115, pr. 11.

N.º 50.222. 5 exemplares. Tipos. Chile (Papudo). C. PORTER leg.

No rótulo está escrito *Papudoia longispina*, e a diagnose original não especifica a localidade-tipo como sendo Papudo, mas apenas diz “arredores de Constitución”.

275. **Metagyndoides granulatus** Mello-Leitão.

*Metagyndoides granulatus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 121, fig. 14 a.

a) N.º 18.209. 1 exemplar. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col.

b) N.º 26.915. 1 exemplar. Itatiáia.

Note-se que o espécime número 18.209 é o indicado na diagnose para tipo, mas só no rótulo do exemplar número 26.915, que não é referido na descrição da espécie, é que está escrito tipo.

**276. *Meteusarcoides mutilatus* Mello-Leitão.**

*Meteusarcoides mutilatus* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 331.

N.º 1.440. 2 exemplares. Tipos. Itatiaia.

Na descrição da espécie está indicado que o material foi coligido por CARLOS MOREIRA.

**277. *Neopachylus mamillosus* Roewer.**

*Neopachylus mamillosus* Roewer, 1915, Arch. Naturg., 81 A (3): 99, fig. 54.

N.º 26.915. 5 exemplares. Cachoeirinha (Paraná). F. LANGE DE MORRETES col. Cf. Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 135.

**278. *Neopucroliella borgmeieri* (Mello-Leitão).**

*Neopucroliella borgmeieri* Mello-Leitão, 1923, Rev. Mus. La Plata, 27: 218 fig. 17.

a) N.º 1.393. 1 exemplar. Tipo. Cordoba (Argentina).

b) N.º 1.393. 1 exemplar. Tipo.

**279. *Nunduavius nebulosus* Mello-Leitão.**

*Nunduavius nebulosus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 11, fig. 8 (Sep.).

N.º 42.276. 5 exemplares. Tipos. Cachoeira (Paraná). F. LANGE col.

**280. *Pachyloides bellicosus* Roewer.**

*Pachyloides bellicosus* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 93, fig. 42, 43.

a) N.º 1.409. Macho e fêmea. Montevideo (Uruguay).

b) N.º 41.200. 1 exemplar. Pôrto Alegre (Rio Grande do Sul). PE. PRO BUCK col.

c) N.º 41.604. 4 exemplares. Rio Grande do Sul. RAMBO col.

d) N.º 1.407. 1 exemplar. Pelotas (Rio Grande do Sul). CÉSAR PINTO col.

**281. *Pachyloides fallax* Mello-Leitão.**

*Pachyloides fallax* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 448, fig. 8, 9; Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 174 (= *Discocyrtus monstrosus* Mello-Leitão, 1940).

*Discocyrtus monstrosus* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 8, fig. 10.

a) N.º 58.397. 2 exemplares. São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul). Tipos. Cf. Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 174.

b) N.º 1.405. 5 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.

**282. *Pachyloides iheringi* Roewer.**

*Pachyloides iheringi* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 97, fig. 44.

a) N.º 26.914. 5 exemplares. Montevideo (Uruguay). CORDERO col.

b) N.º 1.535. 1 exemplar. Montevideo (Uruguay). MELLO-LEITÃO col.



283. **Pachylometoides pugnax** Mello-Leitão.  
*Pachylometoides pugnax* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 25, fig. 20 (Sep.).  
 N.º 42.254. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
284. **Pachylus chilensis** (Gray).  
*Gonyleptes chilensis* Gray, 1833, Anim. Kingdom, 13, pr. 20, fig. 2.  
 a) N.º 1.384. Macho e fêmea. Valparaizo (Chile).  
 b) N.º 51.952. 3 exemplares. Pocillos. REED col.  
 c) N.º 141. 4 exemplares. Casablanca (Chile). J. TOBAR col.
285. **Pachylus paessleri** Roewer.  
*Pachylus paessleri* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 38, fig. 13.  
 a) N.º 1.394. 4 exemplares. Santiago (Chile).  
 b) N.º 58.396. 6 exemplares. El Canedo.  
 c) N.º 151. 3 exemplares. Casablanca (Chile). J. TOBAR col.
286. **Paraluederwaldtia bituberculata** (Mello-Leitão).  
*Neopucrolia bituberculata* Mello-Leitão, 1922, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, 9: 329.  
 N.º 1.404. 2 exemplares. Itatiáia.
287. **Parapachyloides armatus** (Mello-Leitão).  
*Goyazella armata* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 120, fig. 1.  
*Tabatinguera insignis* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 377, fig. 8, 8a.  
*Parapachyloides insignis*, in Piza, 1942, Rev. Brasil. Biol., 2 (4): 404.  
*Parapachyloides uncinatus* Soares, 1943, nec Soerensen, 1879, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 3: 210, fig. 2.  
*Parapachyloides armatus*, in Soares, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool., São Paulo, 6 (15): 164 (= *Parapachyloides insignis* (Mello-Leitão, 1935)).  
 a) N.º 11.373. 1 exemplar. Tipo. Veadeiros (Goiaz). BLASER col.  
 b) N.º 42.478. 1 exemplar. Tabatinguera (São Paulo). Tipo de *Parapachyloides insignis* (Mello-Leitão, 1935).  
 c) N.º 42.479. 1 exemplar. Mato Grosso. Determinado como *Parapachyloides insignis* (Mello-Leitão, 1935).
288. **Piresa ancilla** (Mello-Leitão).  
*Tayoca ancilla* Mello-Leitão, 1937, Rev. Chil. Hist. Nat., año 41: 151, pr. 5, fig. 2.  
 N.º 252. 3 exemplares. Covanca (Rio de Janeiro).
289. **Piresa melanacantha** (Mello-Leitão).  
*Itaoca melanacantha* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 16, fig. 8.  
 N.º 58.235. 6 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
- E' possível que se trata dos tipos, mas êstes têm o número 41.755, e foram coligidos em Gávea (Distrito Federal), segundo se lê na diagnose original.
290. **Piresa timida** (Mello-Leitão).  
*Itaoca timida* Mello-Leitão, 1940, Arq. Zool. Est. São Paulo, 1: 9, fig. 11.  
 N.º 58.321. 3 machos e 4 fêmeas. Tipos. Jussaral (Rio de Janeiro). BERLA col.

**291. *Progyndes basiliscus* Mello-Leitão.**

*Progyndes basiliscus* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 11, fig. 3.  
N.º 41.786. 2 exemplares. Tipos. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

**292. *Progyndes brasiliensis* Mello-Leitão.**

*Progyndes brasiliensis* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 105.  
N.º 414. 2 exemplares. Tipos. Santa Bárbara (Distrito Federal).

A localidade-tipo, indicada na diagnose original, é: Páu da Fome (altitude — 700 metros), Jacarepaguá (Distrito Federal).

**293. *Prosampycus argenteopilosus* Mello-Leitão.**

*Prosampycus argenteopilosus* Mello-Leitão, 1935, An. Acad. Bras. Cien., 7 (1): 5, fig. 1.  
N.º 42.209. 1 exemplar. Tipo. Serro Azul (Paraná). OTON LEONARDO'S col.

**294. *Quitete marginata* Mello-Leitão.**

*Quitete marginata* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 10, fig. 7 (Sep.).  
N.º 42.281. 1 exemplar. Cachoeira (Paraná). F. LANGE col.

Não há dúvida de que se trata do tipo, se bem que o seu número, na diagnose original, seja 42.280.

**295. *Sphaleropachylus butleri* (Thorell).**

*Pachylus butleri* Thorell, 1877, Period. Zool. Argent., 2: 207.  
a) N.º 1.387. 2 exemplares. Buenos Aires (Argentina).  
b) N.º 1.389. 5 exemplares. Cordoba (Argentina).

**296. *Triglochynura curvispina* Mello-Leitão.**

*Triglochynura curvispina* Mello-Leitão, 1924, Ann. Soc. Ent. France, 93: 179.  
N.º 1.480 (ou 840 da coleção MELLO-LEITÃO). 1 exemplar. Tipo. Santos (São Paulo).

A diagnose original diz que o tipo foi coligido por W. S. BRISTOWE.

**297. *Uropachylus anthophilus* (Mello-Leitão).**

*Ypiranga anthophila* Mello-Leitão, 1926, Rev. Mus. Paul., 14: 46 (Sep.).  
N.º 1.399. 1 exemplar. Tipo. Jardim da Aclimação (São Paulo — Capital).

Na diagnose original está indicado que o material foi coligido por W. S. BRISTOWE.

**298. *Ypsilonurus mutilatus* Mello-Leitão.**

*Ypsilonurus mutilatus* Mello-Leitão, 1933, Arq. Esc. Agr. Med. Vet., 10 (2): 137, fig. 18 e 19.  
N.º 27.782. 1 exemplar. Tipo. Ilha do Bananal (Goiaz).



299. **Yraguara annulipes** Mello-Leitão.  
*Yraguara annulipes* Mello-Leitão, 1937, Mem. Inst. But., 10 (1935-1936): 291, fig. 2.  
N.º 42.556. 2 exemplares. Araguari (Minas Gerais).
300. **Zalanodius bicornutus** Mello-Leitão.  
*Zalanodius bicornutus* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 21, fig. 17 (Sep.).  
N.º 42.687. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

### VIII. Subfamília *PROSTYGNINAE*

301. **Leptostygnus leptochirus** Mello-Leitão.  
*Leptostygnus leptochirus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4): 306.  
N.º 134. 1 exemplar. Tipo. Cúcuta (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.

### IX. Subfamília *STYGNICRANAINAE*

302. **Stygnobates barbiellini** Mello-Leitão.  
*Stygnobates barbiellini* Mello-Leitão, 1927, Bol. Mus. Nac., 3 (2): 13.  
a) N.º 1.521 (ou 928). 1 exemplar. São Sebastião (São Paulo).  
b) N.º 56.267. 1 exemplar. Ilha de São Sebastião (São Paulo).  
c) N.º 200. 2 exemplares. Ilha de São Sebastião (São Paulo).

Parece-me que o tipo é o exemplar número 1.521, estando indicado na diagnose original que foi coligido pelo CONDE AMADEU BARBIELLINI.

303. **Zortalia bicalcarata** Mello-Leitão.  
*Zortalia bicalcarata* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 12, fig. 9.  
N.º 42.273. Tipos. Paraná. F. LANGE col.

Na diagnose original está especificado o habitat: Cachoeira (Paraná).

## C. Família *PHALANGODIDAE*

### I. Subfamília *PHALANGODINAE*

304. **Berlesecaptus convexus** Mello-Leitão.  
*Berlesecaptus convexus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 101.  
N.º 111. 2 exemplares. Tipos. Pilar (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

305. **Cynortina brasiliensis** Mello-Leitão.  
*Cynortina brasiliensis* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4): 437.  
N.º 85. 5 exemplares. Tipos. Aruá (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.
306. **Heteromeloleptes padbergi** Mello-Leitão.  
*Heteromeloleptes padbergi* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 117.  
N.º 11.372. 2 exemplares. Tipos. Itatiáia. PADBERG col.
307. **Tibangara nephelina** Mello-Leitão.  
*Tibangara nephelina* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 100.  
N.º 215. 2 exemplares. Tipos. Mangaratiba (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.

## II. Subfamilia TRICOMMATINAE

308. **Bacigalupo tenax** Mello-Leitão.  
*Bacigalupo tenax* Mello-Leitão, 1933, An. Acad. Bras. Cien., 5 (2): 55, fig. 1.  
N.º 1.366. 1 exemplar. Cótipo. Santa Fé (Argentina).
309. **Caporiacoius eximius** Mello-Leitão.  
*Caporiacoius eximius* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 3, fig. 1 (Sep.).  
N.º 42.277. 1 exemplar. Tipo. Antonina (Paraná). F. LANGE col.
310. **Cryptogeobius crassipes** Mello-Leitão.  
*Cryptogeobius crassipes* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 9, fig. 1.  
N.º 41.758. 1 exemplar. Tipo. Gávea (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
311. **Gephyropachylus marginatus** Mello-Leitão. (1)  
*Gephyropachylus marginatus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 441.  
N.º 1.364. 4 exemplares. Tipos. Rio Grande Sul. CESAR PINTO col.
312. **Liops hexabunus** Mello-Leitão.  
*Liops hexabunus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 103.  
N.º 156. 1 exemplar. Tipo. Mangaratiba (Rio de Janeiro). BERLA col.
313. **Lussanvira marmorata** Mello-Leitão.  
*Lussanvira marmorata* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 372, fig. 3.  
N.º 42.352. 2 exemplares. Lussanvira (São Paulo).

Devem ser os tipos, porque são os únicos exemplares desta espécie existentes no Museu Nacional, se bem que o seu número na diagnose original seja 42.366, e a procedência Lussanvira (Mato Grosso).

---

(1) O PROF. MELLO-LEITÃO, em sua monografia dos Opiliões do Brasil (1932) regista *Gephyropachylus marginatus* como sendo espécie descrita em 1931. Não consegui encontrar na literatura outra descrição da espécie, a não ser a de 1932, na referida monografia. Por isto considero a diagnose desta data como sendo a original.



314. **Phalangodella fasciata** Mello-Leitão.  
*Phalangodella fasciata* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 440.  
N.º 1.365. 1 exemplar. Tipo. Itatiáia.
315. **Pinocchio debilis** Mello-Leitão.  
*Pinocchio debilis* Mello-Leitão, 1940, Papéis Avulsos Dep. Zool., S. Paulo, 1: 42.  
N.º 403. 1 exemplar. Tipo. Santa Bárbara (Distrito Federal) .
- A procedência indicada na descrição da espécie é: Serra do Cipó (Minas Gerais).
316. **Pseudopachylus anomalus** Mello-Leitão.  
*Pseudopachylus anomalus* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 31, fig. 24.  
N.º 41.487. 1 exemplar. Tipo. Itatiáia. DA. RISOLETA DA SILVA col.
317. **Pseudopachylus lissonotus** Mello-Leitão.  
*Pseudopachylus lissonotus* Mello-Leitão, 1938, An. Acad. Bras. Cien., 10 (2): 142, fig. 3.  
a) N.º 58.240. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.  
b) N.º 405. 7 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
318. **Pseudopachylus longipes** Roewer.  
*Pseudopachylus longipes* Roewer, 1912, Arch. Naturg., 78 A (3): 162; Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 108.  
a) N.º 1.363. 1 exemplar. Rio de Janeiro.  
b) N.º 42.228. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). J. COUCEIRO col.  
c) N.º 41.494. 1 exemplar. Rio de Janeiro.  
d) N.º 53. 3 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLIA col.
319. **Spinopilar armatus** Mello-Leitão.  
*Spinopilar armatus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 102.  
N.º 94. 1 exemplar. Tipo. Pilar (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
320. **Taquara pilosa** Mello-Leitão.  
*Taquara pilosa* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 20, fig. 16 (Sep.).  
N.º 42.691. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
321. **Trichominua annulipes** Mello-Leitão.  
*Trichominua annulipes* Mello-Leitão, 1938, An. Acad. Bras. Cien., 10 (2): 141, fig. 2.  
N.º 100. 1 exemplar. Tipo. Morro de Caxambu, Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
- O número do tipo, indicado na diagnose original, é 53.935.
322. **Tricommatatus brasiliensis** Roewer.  
*Tricommatatus brasiliensis* Roewer, 1912, Arch. Naturg., 78 A (3): 159.  
N.º 1.361 (ou 874). 1 exemplar. Santos (São Paulo).
323. **Tricommatatus nigripes** Mello-Leitão.  
*Tricommatatus nigripes* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 41, fig. 18.  
N.º 1.362. 1 exemplar. Tipo. Rio de Janeiro.

D. Família *STYGNIDAE*I. Subfamília *HETEROSTYGNINAE*324. *Stygnoplus granulosus* Mello-Leitão.

*Stygnoplus granulosus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2) : 99.  
N.º 68. 7 exemplares. Galipan (Venezuela). BERTHIER col.

E' provável que se trate dos tipos. Na diagnose original há as seguintes indicações: Localidade-tipo: Los Venados — Caracas.

Col.: SRS. MONDOLFI e VIVAS BERTHIER.

II. Subfamília *PHAREINAE*325. *Liophareus mamillatus* Mello-Leitão.

*Liophareus mamillatus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4) : 309, fig. 10.

N.º 326. 1 exemplar. Bogotá (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.

Deve ser, sem dúvida, o tipo.

III. Subfamília *STENOSTYGNINAE*326. *Bunistygnellus macrochelis* Roewer.

*Bunistygnellus macrochelis* Roewer, 1916, Arch. Naturg., 82 A (2) : 122, fig. 23.  
N.º 80. 1 exemplar. Galipan (1.950 metros) — Venezuela. BERTHIER leg.

IV. Subfamília *STYGNINAE*327. *Acrostygnus polyacanthus* (Mello-Leitão).

*Stygnellus polyacanthus* Mello-Leitão, 1923, Arq. Mus. Nac., 24: 178.  
N.º 1.443 (ou 845). 1 exemplar. Campina Grande (Paraíba do Norte).

E', certamente, o tipo, se bem que o número indicado na diagnose original seja 839, da coleção MELLO-LEITÃO. No final da descrição da espécie está declarado que o material foi coligido por TRANQUILINO LEITÃO.

328. *Auranus parvus* Mello-Leitão.

*Auranus parvus* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4) : 441.  
N.º 177. 1 exemplar. Tipo. Aruá (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.



329. **Diplostygnus leonardosi** Mello-Leitão.  
*Diplostygnus leonardosi* Mello-Leitão, 1939, Bol. Biol., n. s., 4 (3): 356.  
N.º 477. 1 exemplar. Tipo. Xingu. LEONARDOS col.
330. **Diplostygnus luteus** Mello-Leitão.  
*Diplostygnus luteus* Mello-Leitão, 1931, Arq. Mus. Nac., 33: 144, fig. 13.  
N.º 11.377. 1 exemplar. Tipo. Pará. E. MAY col.
331. **Diplostygnus ustus** Mello-Leitão.  
*Diplostygnus ustus* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4): 442.  
a) N.º 257. 4 exemplares. Tipos. Barra do Tapirapés (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.  
b) N.º 404. 4 exemplares. Barra do Tapirapés (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.  
c) N.º 1.472. 43 exemplares. Cótipos. Barra do Tapirapés (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.
332. **Metastygneilus longimanus** Mello-Leitão.  
*Metastygneilus longimanus* Mello-Leitão, 1928, Bol. Mus. Nac., 4 (2): 13.  
N.º 1.441. 1 exemplar. Tipo. Tapera (Pernambuco). D. BENTO PICKEL col.
- Quanto ao habitat, a diagnose original indica ser Pesqueira e não Tapera, no Estado de Pernambuco.
333. **Pickeliana pickeli** Mello-Leitão.  
*Pickeliana pickeli* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.ª pte.): 427.  
N.º 1.444. 4 exemplares. Tipos. Tapera (Pernambuco). D. BENTO PICKEL col.
334. **Protimesius gracilis** Roewer.  
*Protimesius gracilis* Roewer, 1913, Arch. Naturg., 79 A (4): 439, fig. 173.  
N.º 1.442. 1 exemplar. Tapera (Pernambuco). D. BENTO PICKEL col.

## Subordem PALPATORES

### Família PHALANGIIDAE

#### I. Subfamília GAGRELLINAE

335. **Bastioides coxopunctata** Mello-Leitão.  
*Bastioides coxopunctata* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 116.  
N.º 1.360. 1 exemplar. Tipo. Ilhéus (Bahia). E. MAY col.
336. **Corderobunus corderoi** (Mello-Leitão).  
*Hypsibunus corderoi* Mello-Leitão, 1936, Bol. Mus. Nac., 12 (3-4): 17, fig. 13 (Sep.).  
N.º 42.557. Tipo. Jatobá (Pernambuco). ERGASTO E. CORDERO col.
337. **Corderobunus vittatus** Mello-Leitão.  
*Corderobunus vittatus* Mello-Leitão, 1939, Bol. Biol., n. s., 4 (3): 356.  
N.º 286. 1 exemplar. Tipo. Ilha do Bananal. F. CURADO col.

**338. *Garleppa marmorata* Mello-Leitão.**

*Garleppa marmorata* Mello-Leitão, 1935, Arq. Mus. Nac., 36 (1934): 30, fig. 23 e 23a.

N.º 41.854. 1 exemplar. Tipo. Ribeira do Iguape. OTON LEONARDOS col.

Não encontrei referência a esta espécie na chave organizada para as espécies do gênero *Garleppa* Roewer, 1912 (Cf. Mello-Leitão, 1938, An. Acad. Bras. Cien., 10 (4): 335).

**339. *Geaya bahiensis* Mello-Leitão.**

*Geaya bahiensis* Mello-Leitão, 1931, Bol. Mus. Nac., 7 (2): 115, fig. 1.

N.º 1.358. 1 exemplar. Tipo Ilheus (Bahia). E. MAY col.

**340. *Geaya bicornuta* Mello-Leitão.**

*Geaya bicornuta* Mello-Leitão, 1939, Bol. Biol., n. s. 4 (3): 352, fig. 1 a 4.

N.º 418. 1 exemplar. Tipo. Xingu. HENRY LEONARDOS col.

**341. *Geaya bivittata* Mello-Leitão.**

*Geaya bivittata* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 93.

N.º 113. 6 exemplares. Tipos. El Valle (Venezuela).

No final da diagnose da espécie está indicado o seguinte, quanto ao habitat: El Valle — Caracas (material coligido por VINAS).

**342. *Geaya brunea* Mello-Leitão.**

*Geaya brunea* Mello-Leitão, 1941, An. Acad. Bras. Cien., 13 (3): 165.

N.º 241. 2 exemplares. Tipos.

Na descrição da espécie é que está indicada a localidade-tipo: La Uvita (Colômbia), material coligido pelo IRMÃO NICÉFORO MARIA.

**343. *Geaya inermis* Mello-Leitão.**

*Geaya inermis* Mello-Leitão, 1939, Bol. Biol., n. s., 4 (3): 354.

N.º 263. 1 exemplar. Tipo. Xingu. HENRY LEONARDOS col.

**344. *Geaya nigricoxa* Roewer.**

*Geaya nigricoxa* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 160, pr. 3, fig. 7 e 10.

a) N.º 1.357. 1 exemplar. Pará. E. MAY col.

b) N.º 1.354. 13 exemplares. Tapirapés (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.

**345. *Geaya nigriventris* Mello-Leitão.**

*Geaya nigriventris* Mello-Leitão, 1941, Rev. Brasil. Biol., 1 (4): 436.

N.º 1.533. 1 exemplar. Tipo. Tapirapés (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.

No rótulo estava escrito *Geaya castaneiventris*, mas é claro que êste foi o primeiro nome proposto para *Geaya nigriventris*, não tendo sido utilizado.



**346. Geaya spinipalpis Mello-Leitão.**

*Geaya spinipalpis* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 94.  
N.º 183. 2 exemplares. Tipos. Venezuela. PROF. E. H. CORDERO col.

No final da diagnose está especificado o habitat: Quebrada El Avila — Caracas.

**347. Geaya unicolor Roewer.**

*Geaya unicolor* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 161, pr. 3, fig. 30, pr. 4, fig. 53.

- a) N.º 480. 3 exemplares. Tapirapés (Pará). A. LEITÃO DE CARVALHO col.
- b) N.º 61. 1 exemplar.

**348. Geaya variegata Mello-Leitão.**

*Geaya variegata* Mello-Leitão, 1939, Bol. Biol., n. s., 4 (3): 353, fig. 5 e 6.  
N.º 45. 1 exemplar. Tipo. Xingu. HENRY LEONARDOS col.

**349. Holcobunus ater Roewer.**

*Holcobunus ater* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 165.

- a) N.º 1.355. 4 exemplares. Petrópolis (Rio de Janeiro).
- b) N.º 41.417. 1 exemplar. Petrópolis (Rio de Janeiro). ROHR col.
- c) N.º 1.541. 9 exemplares. Distrito Federal. J. MOOJEN col.

**350. Holcobunus citrinus (Pocock).**

*Prionostemma citrinus* Pocock, 1903, Ann. Nat. Hist., ser. 7, 11: 435.

- a) N.º 11.370. 1 exemplar. Rio de Janeiro.
- b) N.º 989. 4 exemplares. Blumenau (Santa Catarina).
- c) N.º 41.812. 17 exemplares. Iporanga e Iguape.
- d) N.º 1.356. 1 exemplar. Caxambu (Minas Gerais).
- e) N.º 58.812. 1 exemplar. Goitacazes (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

**351. Holcobunus dentatus Roewer.**

*Holcobunus dentatus* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 164, pr. 2, fig. 34, pr. 4, fig. 49, 50.

- a) N.º 42.436. 1 exemplar. Serra Friburgo. ROSA col.
- b) N.º 42.434. 4 exemplares. Guaraquetuba. LANGE col.
- c) N.º 41.802. 1 exemplar. Rio Iporanga. LEONARDOS col.
- d) N.º 41.931. 6 exemplares. Iguape.

**352. Holcobunus iguassuensis Mello-Leitão.**

*Holcobunus iguassuensis* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 369, fig. 1.

- a) N.º 42.435. 1 exemplar. Tipo. São José (margem do Rio Iguapé). F. LANGE DE MORRETES col.
- b) N.º 483. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
- c) N.º 435. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.
- d) N.º 250. 9 exemplares. J. MOOJEN col.

**353. Holcobunus luteipalpis Roewer.**

*Holcobunus luteipalpis* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 164, pr. 4, fig. 11 e 12.

- N.º 58.056. 4 exemplares. São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul).

354. **Holcobunus luteovariatus** Mello-Leitão.  
*Holcobunus luteovariatus* Mello-Leitão, 1932, Rev. Mus. Paul., 17 (2.<sup>a</sup> pte.): 438, fig. 2.  
 a) N.º 8.903. 1 exemplar. Tipo. Mendes (Rio de Janeiro). MELLO-LEITÃO col.  
 b) N.º 8.901. 2 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.  
 c) N.º 11.371. 2 exemplares. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.
355. **Holcobunus nigripalpis** Roewer.  
*Holcobunus nigripalpis* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 163, pr. 3, fig. 12, pr. 4, fig. 4 e 5.  
 a) N.º 1.270. 1 exemplar. Serro Azul (Paraná). LEONARDOS col.  
 b) N.º 58.057. 1 exemplar. São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul).
356. **Holcobunus roseus** Mello-Leitão.  
*Holcobunus roseus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 96.  
 N.º 133. 3 exemplares. Tipos. Santa Teresa (Espírito Santo). AUGUSTO RUSCHI col.
357. **Holmbergiana weyemberghi** (Holmberg).  
*Opilio weyemberghi* Holmberg, 1876, An. Agric. Argent., 4, n.º 88.  
 N.º 8.902. 7 exemplares. Buenos Aires (Argentina). J. CANALS leg.
358. **Jussara obesa** Mello-Leitão.  
*Jussara obesa* Mello-Leitão, 1935, Mem. Inst. But., 9: 371, fig. 2.  
 N.º 42.426. 1 exemplar. Tipo. Angra dos Reis (Rio de Janeiro). J. LINS col.  
 Na descrição da espécie o habitat está mais especificado: Jussaral (350 metros). Em lista remissiva organizada para as espécies sul-americanas de *Palpatores* não há referência a esta espécie nem ao gênero *Jussara* Mello-Leitão, 1935. Cf. Mello-Leitão, 1938, An. Acad. Bras. Cien., 10 (4): 317 a 337.
359. **Paratamboicus bicornutus** Mello-Leitão.  
*Paratamboicus bicornutus* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 97.  
 N.º 273. 1 exemplar. Tipo. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). BERLA col.  
 Na diagnose da espécie a localidade-tipo está mais detalhada: Páu da Fome (700 metros de altitude), Jacarepaguá (Distrito Federal).
360. **Prionostemma albimanum** Roewer.  
*Prionostemma albimanum* Roewer, 1912, Mém. Soc. Neuchât., 5: 157, pr. 8, fig. 10.  
 N.º 74. 2 exemplares. Cúcuta (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.
361. **Prionostemma intermedium** Mello-Leitão. (1)  
*Prionostemma intermedium* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (4): 311, fig. 11.  
 N.º 479. 1 exemplar. Tipo. Bogotá (Colômbia). IRMÃO NICÉFORO MARIA col.

(1) E' necessário que o PROF. MELLO-LEITÃO dê nome novo a esta espécie de *Prionostemma* Pocock, 1903, porque *Prionostemma intermedium* é nome que já foi usado anteriormente por Banks, ao descrever seu *Liobunum intermedium*, em 1909, que passou posteriormente para o gênero *Prionostemma*.



**362. Prionostemma minimum** Roewer.

*Prionostemma minimum* Roewer, 1910, Abh. Ver. Hamburg., 19 (4): 181, pr. 2, fig. 33, pr. 4, fig. 10.

N.º 58.213. 1 exemplar. Colatina (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.

**363. Prionostemma ruschii** Mello-Leitão.

*Prionostemma ruschii* Mello-Leitão, 1940, An. Acad. Bras. Cien., 12 (2): 95.

N.º 261. 1 exemplar. Tipo. Santa Teresa (Espírito Santo). AUGUSTO RUSCHI col.

**364. Tamboicus silvicolus** Mello-Leitão.

*Tamboicus silvicolus* Mello-Leitão, 1932, Bol. Mus. Nac., 8: 71; Mello-Leitão, 1938, An. Acad. Bras. Cien., 10 (4): 337 (= *Symphathica bisignata* Mello-Leitão, 1933 = *Symphathica inermis* Mello-Leitão, 1933).

*Symphathica bisignata* Mello-Leitão, 1933, An. Acad. Bras. Cien., 5 (3): 101, fig. 5 e 6 (embaixo das figuras 5 e 6 é que se lê o nome *Symphathica inermis*, bem como no índice das figuras, à página 103).

a) N.º 16.133. 1 exemplar. Tipo. Friburgo (Rio de Janeiro). Na diagnose o número do tipo é 14.133.

b) N.º 254. 2 exemplares. Fazenda Rubião. R. ARLÉ col. Determinados como *Tamboicus silvicolus* Mello-Leitão, 1932.

c) N.º 41.930. 1 exemplar. Friburgo (Rio de Janeiro). Tipo de *Symphathica bisignata* Mello-Leitão, 1933. Note-se que o número do tipo desta espécie, que se lê em sua descrição, é 26.912.

## II. Subfamília LIOBUNINAE

**365. Liobunum bruchi** Mello-Leitão.

*Liobunum bruchi* Mello-Leitão, 1933, An. Acad. Bras. Cien., 5 (3): 100, fig. 3 e 4.

N.º 26.913. Tipo. Zinacanteprec (México). CARLOS BRUCH col.

## III. Subfamília NEOPILIONINAE

**366. Acropiliops ruricola** Mello-Leitão.

*Acropiliops ruricola* Mello-Leitão, 1933, An. Acad. Bras. Cien., 5 (3): 100, fig. 1 e 2.

N.º 26.911. 1 exemplar. Tipo. Cachoeirinha (Paraná).

No final da descrição está indicado que o tipo foi coligido por F. LANGE DE MORRETES.

Havia ainda, nesta preciosa coleção, alguns opiliões com rótulos contendo nomes que não consegui encontrar na literatura. Sòmente a redeterminação dêste material poderá decidir o caso. Resolvi citar tais nomes, pois podem ser uteis a quem

quizer revêr a coleção, bem como tornam completo o balanço dado por mim nos opiliões do Museu Nacional.

Ei-los:

1. **Ancistrotellus albimanu.**  
N.º 142. 3 exemplares. Tipos. Jacarepaguá (Rio de Janeiro).  
(*Gonyleptidae* - *Mitobatinae*).
2. **Ancistrotellus gracilioides.**  
N.º 290. 1 exemplar. Tipo. Covanca (Rio de Janeiro).  
(*Gonyleptidae* - *Mitobatinae*).
3. **Ancistrotellus luteimanu** Mello-Leitão.  
N.º 58.324. 4 exemplares. Jussara, Angra dos Reis (Rio de Janeiro). BER-  
LA col.  
(*Gonyleptidae* - *Mitobatinae*).
4. **Caelopygoides pulcher** Mello-Leitão.  
N.º 42.230. 1 exemplar. Petrópolis (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.
5. **Discocyrtus anulipes** Mello-Leitão.  
N.º 53.920. 1 exemplar. Pirenópolis. LEONARDOS col.  
(*Gonyleptidae* - *Pachylinae*).
6. **Discocyrtus ramboi.**  
N.º 41.647. 2 exemplares. Tipos. Rio Grande do Sul. RAMBO col.  
(*Gonyleptidae* - *Pachylinae*).
7. **Enantiocentron proximum** Mello-Leitão.  
N.º 58.208. 8 exemplares. Goitacazes (Espírito Santo). MÁRIO ROSA col.  
(*Gonyleptidae* - *Pachylinae*).
8. **Enantiocentron setosus** Mello-Leitão.  
N.º 50.399. 1 exemplar. Jacarepaguá (Rio de Janeiro). R. ARLÉ col.  
(*Gonyleptidae* - *Pachylinae*).
9. **Eusarcus intermedius.**  
N.º 285. 1 exemplar. Tipo. Serra do Cipó (Minas Gerais). MARTINS leg.  
(*Gonyleptidae* - *Pachylinae*).
10. **Geogonys pallidimanus** Mello-Leitão.  
N.º 41.646. Tipo. Rio Grande do Sul. RAMBO col.  
(*Gonyleptidae* - *Gonyleptinae*).
11. **Heterobunus indecisus** Mello-Leitão.  
N.º 42.365. Lussanvira. WORONTZOW col.
12. **Japiroides paranensis** Mello-Leitão.  
N.º 58.393. 1 exemplar. Rio Negro (Paraná).
13. **Metarthrodes bifasciatus** Mello-Leitão.  
N.º 1.446. 1 exemplar. Tipo. Petrópolis (Rio de Janeiro).  
(*Gonyleptidae* - *Caelopyginae*).



14. **Metarthrodes margaritatus** Giltay.  
N.º 11.393. 1 exemplar. Itanhaem. SPITZ col.  
(*Gonyleptidae* - *Caelopyginae*).
15. **Meterginus uniformis**.  
N.º 175. 2 exemplares. Tipos. Bogotá (Colômbia).  
(*Cosmetidae* - *Cosmetinae*).
16. **Mirarasoca mutilata**. (1)  
N.º 1.478. 1 exemplar. Tipo. São Paulo.
17. **Nygoleptes** sp. (2)  
N.º 1.571. 1 exemplar. Santa Bárbara (Minas Gerais). MORAIS col.  
(*Gonyleptidae* - *Gonyleptinae*).
18. **Penygorna guasca** Mello-Leitão.  
N.º 58.059. 4 machos e 2 fêmeas. São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul).  
GLIESCH col.  
(*Gonyleptidae* - *Gonyleptinae*).
19. **Prosancistrotus communis**.  
N.º 41.788. 9 exemplares. Tipos. Bico do Papagaio (Rio de Janeiro). R. AR-  
LÉ col.

### ABSTRACT

The author gives a check-list of species of *Opiliones* belonging to the collection of the "Museu Nacional do Rio de Janeiro", Brasil. It is not a revision of the material, but a check on labels of examples, with reference to the indications (number and type-locality) of the original description of species or to the citations of described species. The number of specimens in each lot was also counted.

After enumerating the species, he gives another list of labelled material, the names of which he could not trace in literature. Only the revision of this material will elucidate the question.

---

(1) Examinei este espécime, tentando redeterminá-lo. O material, porém, está completamente mutilado, tornando-se indeterminável.

(2) O gênero *Nygoleptes* Mello-Leitão, 1931, não existe mais, sendo sinônimo de *Acanthogonyleptes* Mello-Leitão, 1922 (Cf. Soares, 1943, Boletim de Indústria Animal, São Paulo, n. s., 6 (3):54). *Acanthogonyleptes* Mello-Leitão, 1922, é, por sua vez, sinônimo de *Paragonyleptes* Roewer, 1913. E' necessário revêr o material.







