

*Técnica:* Conforme indicam as figuras, coloca-se firmemente, o polegar e o indicador sôbre a depressão cutânea correspondente a duas apófises espinhosas. Manda-se o paciente executar flexão e extensão da coluna. Êstes movimentos transmitem nítida impressão de mobilidade ao pesquisador, que deslocando os dedos ao longo da linha espondiloideia terá também sensação de "quantum" comparativo entre as diversas regiões estudadas. Cada vez que se desloca os dedos, o paciente deverá executar os movimentos.

Êste método se caracteriza pela extrema sensibilidade e por mínimo que sejam os movimentos, êstes poderão ser percebidos pelo pesquisador. Valemo-nos muito dêle para laudos de incapacidade de trabalho e avaliação dos resultados de artrodeses.




## ANESTESIA TÓPICA COM TETRACAÍNA EM FERIMENTOS DE DEDOS

JOÃO ALVARENGA ROSSI \*

Iniciamos em 1953, no Pronto Socorro da Clínica Ortopédica e Traumatológica do Hospital das Clínicas, o uso de solução de tetracaína a 2%, como veículos de anestesia tópica em ferimentos de dedos.

Entre outros, êste método oferece as seguintes vantagens:

- a) Técnica de aplicação extremamente simples.
- b) Permite realizar na ferida, limpeza mecânica e curativo com máximo de assepsia.
- c) Tem indicação principalmente em crianças, pois sua aplicação não só é indolor, como alivia quase de imediato as dores.



\* Assistente da Clínica Ortopédica e Traumatológica (Prof. F. E. Godoy Moreira) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Como mostra a figura, mergulha-se o dedo ou os dedos atingidos, em pequena cuba contendo solução de tetracaína a 2%, durante cêrca de 20 minutos.

O uso da solução de tetracaína a 2%, incorporou-se à rotina do Pronto Socorro da Clínica Ortopédica e Traumatológica, não se tendo observado reações peculiares à tetracaína em nenhum dos casos, tendo-se em conta que a absorção é muito pequena.

*RESUMO:* O Autor apresenta um método de anestesia tópica com tetracaína como valioso auxiliar no tratamento de urgência, inicial de ferimentos de dedos. A tetracaína é usada na concentração de 2%.

*SUMMARY:* The Author presents a method of topic anesthesia using Tetracaine as a helpfull inicial treatment as emergency in the management of the finger injuries. The Tetracaine is used in concentration of 2%.